

## SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA

### 1. NAZIV LIJEKA

Risperidon Grindeks 0,5 mg filmom obložene tablete  
Risperidon Grindeks 1 mg filmom obložene tablete  
Risperidon Grindeks 2 mg filmom obložene tablete  
Risperidon Grindeks 3 mg filmom obložene tablete  
Risperidon Grindeks 4 mg filmom obložene tablete  
Risperidon Grindeks 6 mg filmom obložene tablete

### 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka filmom obložena tableta sadrži 0,5 mg risperidona.  
Svaka filmom obložena tableta sadrži 1 mg risperidona.  
Svaka filmom obložena tableta sadrži 2 mg risperidona.  
Svaka filmom obložena tableta sadrži 3 mg risperidona.  
Svaka filmom obložena tableta sadrži 4 mg risperidona.  
Svaka filmom obložena tableta sadrži 6 mg risperidona.

#### Pomoćna tvar s poznatim učinkom:

Svaka 0,5 mg filmom obložena tableta sadrži 73,5 mg laktoze.  
Svaka 1 mg filmom obložena tableta sadrži 73 mg laktoze.  
Svaka 2 mg filmom obložena tableta sadrži 146 mg laktoze i Sunset Yellow FCF (E110).  
Svaka 3 mg filmom obložena tableta sadrži 219 mg laktoze.  
Svaka 4 mg filmom obložena tableta sadrži 292 mg laktoze i tartrazin (E102).  
Svaka 6 mg filmom obložena tableta sadrži 438 mg laktoze.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

### 3. FARMACEUTSKI OBLIK

Filmom obložena tableta.

Risperidone 0,5 mg je ružičasta, okrugla bikonveksna filmom obložena tableta. Veličina tablete: približno 6 mm x 3 mm.

Risperidone 1 mg je bijela, okrugla bikonveksna filmom obložena tableta. Veličina tablete: približno 7 mm x 3 mm.

Risperidone 2 mg je narančasta, okrugla bikonveksna filmom obložena tableta s razdjelnim urezom na jednoj strani. Veličina tablete: približno 8 mm x 4 mm. Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Risperidone 3 mg je bež, okrugla bikonveksna filmom obložena tableta. Veličina tablete: približno 9 mm x 5 mm.

Risperidone 4 mg je žučkasto-zelena, okrugla bikonveksna filmom obložena tableta s dvostrukom razdjelnim urezom na jednoj strani. Veličina tablete: približno 11 mm x 4 mm. Tabletu se može razdijeliti na jednake doze.

Risperidone 6 mg je smeđkasta, okrugla bikonveksna filmom obložena tableta s razdjelnom linijom na jednoj strani. Veličina tablete: približno 12 mm x 5 mm. Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

### 4. KLINIČKI PODACI

#### 4.1. Terapijske indikacije

Risperidon Grindeks je indiciran za liječenje shizofrenije.

Risperidon Grindeks je indiciran za liječenje umjerenih do teških maničnih epizoda povezanih s bipolarnim poremećajem.

Risperidon Grindeks je indiciran za kratkotrajno liječenje (do 6 tjedana) perzistentne agresije u bolesnika s umjerenom do teškom Alzheimerovom demencijom bez odgovora na nefarmakološke metode liječenja, a kada postoji rizik da sebi ili drugima nanesu ozljede.

Risperidon Grindeks je indiciran za kratkotrajno simptomatsko liječenje (do 6 tjedana) perzistentne agresije u djece nakon 5. godine starosti i adolescenata s poremećajem ponašanja i ispodprosječnom intelektualnom funkcijom ili mentalnom retardacijom dijagnosticiranim prema DSM-IV kriterijima, u kojih težina agresije ili drugi oblici poremećaja ponašanja zahtijevaju farmakološko liječenje. Farmakološko liječenje treba biti dio integralnog i sveobuhvatnog programa liječenja, uključujući psihosocijalnu i edukacijsku intervenciju. Preporučuje se da liječenje risperidonom propisuje liječnik specijalist dječje neurologije ili dječje i adolescentne psihijatrije ili liječnik educiran za liječenje poremećaja ponašanja djece i adolescenata.

#### **4.2. Doziranje i način primjene**

##### Doziranje

##### Shizofrenija

##### *Odrasli*

Risperidon Grindeks može se davati jedanput ili dva puta na dan.

Terapiju je potrebno započeti s 2 mg risperidona na dan. Drugog dana doza se može povećati na 4 mg na dan. Nakon toga doza se više ne mora mijenjati, ili se može dalje prilagođavati svakom pojedinom bolesniku, ako je potrebno. Uobičajena optimalna doza za većinu bolesnika je 4 do 6 mg na dan. U nekim bolesnika potrebna je sporija titracija te niža početna doza i doza održavanja.

Doze više od 10 mg na dan nisu se pokazale djelotvornijim od nižih doza, a mogu uzrokovati povećanu incidenciju ekstrapiramidalnih simptoma. Kako neškodljivost doza većih od 16 mg/dan nije ispitana, ne preporučuje se njihovo korištenje.

##### *Starije osobe*

Preporučuje se početna doza od 0,5 mg dva puta na dan. Ova doza može se prilagođavati svakom pojedinom bolesniku uz povećanja doze od po 0,5 mg dva puta na dan do konačne doze od 1 do 2 mg dva puta na dan.

##### *Pedijatrijska populacija*

Liječenje risperidonom ne preporučuje se za liječenje shizofrenije u djece i adolescenata mlađih od 18 godina zbog nedostatka podataka o djelotvornosti.

##### Manične epizode kod bipolarnog poremećaja

##### *Odrasli*

Risperidon Grindeks potrebno je primijeniti jedanput na dan, s početnom dozom od 2 mg. Ako je potrebno, dozu je potrebno prilagoditi tako da se poveća za 1 mg na dan, u intervalima koji nisu manji od 24 sata. Preporučeno doziranje risperidona je u rasponu od 1 mg do 6 mg na dan, tako da je za svakog pojedinog bolesnika optimiziran omjer djelotvornosti i podnošljivosti. Dnevna doza lijeka viša od 6 mg risperidona nije ispitivana u bolesnika s maničnim epizodama.

Kao i kod svakog simptomatskog liječenja, kontinuirano korištenje lijeka Risperidon Grindeks potrebno je redovito pratiti i evaluirati.

#### *Starije osobe*

Preporučuje se početna doza od 0,5 mg dva puta na dan. Ova doza može se prilagođavati pojedinom bolesniku uz povećanja doze od po 0,5 mg dva puta na dan do konačne doze od 1 do 2 mg dva puta na dan. S obzirom na ograničeno kliničko iskustvo u starijih osoba, potreban je oprez.

#### *Pedijatrijska populacija*

Liječenje bipolarne manije risperidonom ne preporučuje se u djece i adolescenata mlađih od 18 godina zbog nedostatka podataka o djelotvornosti.

#### Perzistentna agresija u bolesnika s umjerenom do teškom Alzheimerovom demencijom

Preporučuje se početna doza od 0,25 mg oralne otopine dva puta na dan. Oralna otopina je preporučeni farmaceutski oblik za primjenu doze od 0,25 mg. Ova doza može se prilagođavati pojedinom bolesniku uz povećanja doze od po 0,25 mg dva puta na dan, ne češće od svaki drugi dan, ako je potrebno. U većine bolesnika optimalna doza iznosi 0,5 mg dva puta na dan. Nekim bolesnicima, međutim, može biti potrebna doza do 1 mg dva puta na dan.

Risperidon Grindeks ne bi se smio uzimati dulje od 6 tjedana u bolesnika s perzistentnom agresijom kod Alzheimerove demencije. Tijekom liječenja, bolesnike je potrebno često i redovito procjenjivati, kao i potrebu za nastavkom liječenja.

#### Poremećaj ponašanja

##### *Djeca i adolescenti u dobi od 5 do 18 godina*

Za bolesnike s i iznad 50 kg preporučuje se početna doza od 0,5 mg jedanput na dan. Ako je potrebno, doza lijeka može se individualno povisiti, ne češće od svakog drugog dana za 0,5 mg na dan. Za većinu bolesnika optimalna doza iznosi 1 mg jedanput na dan. Nekim bolesnicima dovoljna je doza od 0,5 mg jedanput na dan, dok drugima može biti potrebno 1,5 mg jedanput na dan.

Za bolesnike do 50 kg preporučuje se početna doza od 0,25 mg oralne otopine jedanput na dan. Oralna otopina preporučeni je farmaceutski oblik za primjenu doze od 0,25 mg. Ako je potrebno, doza lijeka može se individualno povisiti, ne češće od svaki drugi dan za 0,25 mg na dan. Za većinu bolesnika optimalna doza iznosi 0,5 mg jedanput na dan. Nekim bolesnicima dovoljna je doza od 0,25 mg jedanput na dan, dok drugima može biti potrebno 0,75 mg oralne otopine jedanput na dan. Oralna otopina preporučeni je farmaceutski oblik za primjenu doze od 0,75 mg.

Kao i kod svakog simptomatskog liječenja, kontinuirano korištenje lijeka Risperidon Grindeks potrebno je redovito pratiti i evaluirati.

Za liječenje ovog poremećaja u djece mlađe od 5 godina nema dovoljno iskustva, stoga se ne preporučuje upotreba lijeka Risperidon Grindeks kod navedene dobne skupine.

#### Oštećenje bubrega i jetre

U bolesnika s oštećenjem bubrega mogućnost eliminacije djelatne frakcije s antipsihotičnim učinkom je manja nego u odraslih s normalnom funkcijom bubrega. Bolesnici s oštećenom jetrenom funkcijom imaju povišenu koncentraciju frakcije slobodnog risperidona u plazmi.

Bez obzira na indikaciju, potrebno je prepoloviti početnu i nastavnu dozu, a prilagodba doze trebala bi se odvijati sporije u bolesnika s oštećenjem bubrega ili jetre.

Risperidon Grindeks potrebno je koristiti s oprezom kod ove skupine bolesnika.

## Način primjene

Risperidon Grindeks primjenjuje se kroz usta. Hrana ne utječe na apsorpciju lijeka Risperidon Grindeks.

Kod prestanka liječenja, preporučuje se postupan prekid primjene lijeka. Vrlo su rijetko bili prijavljeni simptomi akutnog uestezanja, uključujući mučninu, povraćanje, znojenje i nesanicu, nakon naglog prekida uzimanja antipsihotika u visokim dozama (vidjeti dio 4.8). Jednako tako, može doći do ponovnog javljanja psihotičnih simptoma, a prijavljena je i pojava nevoljnih pokreta (poput akatizije, distonije i diskinezije).

### *Uvođenje lijeka Risperidon Grindeks umjesto drugog antipsihotika*

Ako je medicinski opravdano, tijekom uvođenja lijeka Risperidon Grindeks u terapiju preporučuje se postupno ukidanje prethodne terapije. Također, ako je medicinski opravdano, kada se depo oblici antipsihotika zamjenjuju lijekom Risperidon Grindeks, potrebno ga je početi primjenjivati u vrijeme kada je prema rasporedu red za sljedeću injekciju. Potrebu za nastavkom dotadašnje primjene antiparkinsonika povremeno treba preispitati.

## **4.3. Kontraindikacije**

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

## **4.4. Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi**

### Stariji bolesnici s demencijom

#### *Povećan mortalitet u starijih osoba s demencijom*

U meta analizi koja je uključila 17 kontroliranih kliničkih ispitivanja s atipičnim antipsihoticima, uključujući risperidon, u starijih bolesnika s demencijom liječenih atipičnim antipsihoticima primijećen je povećani mortalitet u odnosu na placebo. U placebo kontroliranim ispitivanjima s oralnim risperidonom u spomenutoj populaciji, incidencija mortaliteta iznosila je 4,0% u bolesnika liječenih risperidonom, u odnosu na 3,1% u onih liječenih placebom. Omjer izgleda (95% interval pouzdanosti) iznosio je 1,21 (0,7; 2,1). Srednja dob bolesnika koji su umrli bila je 86 godina (raspon od 67 do 100). Podaci iz dvaju velikih opservacijskih ispitivanja pokazali su da stariji ljudi s demencijom koji se liječe tipičnim antipsihoticima također imaju malo povećan rizik od smrti, u usporedbi s onima koji se ne liječe. Ne postoji dovoljno podataka koji bi jasno utvrdili točnu veličinu rizika, a uzrok povećanog rizika nije poznat. Opseg do kojeg ovi nalazi povećanog mortaliteta u opservacijskim ispitivanjima mogu biti pripisani antipsihotičkim lijekovima u odnosu na karakteristike bolesnika nije jasan.

#### *Istovremena primjena s furosemidom*

U placebo kontroliranim ispitivanjima risperidona u starijih bolesnika s demencijom, primijećena je viša incidencija mortaliteta u bolesnika liječenih furosemidom u kombinaciji s risperidonom (7,3%; srednja dob 89 godina; raspon 75-97 godina), nego u bolesnika liječenih samo risperidonom (3,1%; srednja dob 84 godina; raspon 70-96 godina) ili samo furosemidom (4,1%; srednja dob 80 godina; raspon 67-90 godina). Povećani mortalitet u bolesnika liječenih furosemidom u kombinaciji s risperidonom primijećen je u dva od četiri klinička ispitivanja. Istodobna primjena risperidona i drugih diuretika (uglavnom tiazidskih diuretika korištenih u nižim dozama) nije bila povezana sa sličnim rezultatima.

Nije pronađen patofiziološki mehanizam koji bi objasnio ove nalaze, a jednako tako nije pronađena ni konzistentnost u uzrocima smrti. Unatoč tome, prije odluke o primjeni terapije, neophodan je oprez, kao i procjena odnosa koristi i rizika ove kombinacije lijekova ili istodobne primjene risperidona s drugim potentnim diureticima. Nije primijećena povećana incidencija mortaliteta u bolesnika koji su

uzimali druge diuretike u kombinaciji s risperidonom. Neovisno o vrsti liječenja, dehidracija je bila faktor rizika za mortalitet te ju je stoga potrebno pažljivo izbjegavati u starijih bolesnika s demencijom.

#### Cerebrovaskularni štetni događaji (CVAE)

U randomiziranim placebo kontroliranim kliničkim ispitivanjima s nekim atipičnim antipsihoticima u bolesnika s demencijom, primijećen je približno 3 puta veći rizik od cerebrovaskularnih štetnih događaja. Zajednički podaci dobiveni iz šest placebo kontroliranih ispitivanja s risperidonom u pretežno starijih bolesnika (>65 godina) s demencijom pokazala su da su se CVAE (ozbiljni i ne-ozbiljni te kombinirani) pojavili u 3,3% (33/1009) bolesnika liječenih risperidonom i u 1,2% (8/712) bolesnika liječenih placebom. Omjer izgleda (95% interval pouzdanosti) iznosio je 2,96 (1,34; 7,50). Mehanizam nastanka ovog povećanog rizika nije poznat. Povećani rizik ne može biti isključen i za druge antipsihotike ili drugu populaciju bolesnika. Risperidon Grindeks potrebno je primjenjivati s oprezom u bolesnika s rizičnim čimbenicima za moždani udar.

Rizik od CVAE bio je značajno viši u bolesnika s kombiniranom ili vaskularnom demencijom u usporedbi s Alzheimerovom demencijom. S obzirom na navedeno, bolesnici s demencijom bilo kojeg drugog tipa osim Alzheimerove ne bi smjeli biti liječeni risperidonom.

Liječnicima se savjetuje da procijene odnos koristi i rizika primjene lijeka Risperidon Grindeks u starijih bolesnika s demencijom, uzimajući u obzir prediktore rizika za razvoj moždanog udara u pojedinog bolesnika. Bolesnike/njegovatelje potrebno je upozoriti da odmah prijave znakove i simptome potencijalnih CVAE, kao što su iznenadna slabost ili obamrllost lica, ruku ili nogu i problemi s govorom ili vidom. Potrebno je, bez odgađanja, razmotriti sve mogućnosti liječenja, uključujući i prestanak primjene risperidona.

Risperidon Grindeks potrebno je primjenjivati samo kratkoročno za liječenje perzistentne agresije u bolesnika s umjerenom do teškom Alzheimerovom demencijom, kao dodatak nefarmakološkim mjerama liječenja koje su bile nedjelotvorne ili ograničeno djelotvorne i kada ne postoji rizik da bolesnici ozljede sebe ili druge.

Bolesnike je potrebno redovito kontrolirati te razmotriti potrebu za nastavkom kontinuiranog liječenja.

#### Ortostatska hipotenzija

Uslijed toga što djeluje kao alfa-blokator, risperidon može uzrokovati (ortostatsku) hipotenziju, naročito u početnom razdoblju titracije doze. Nakon stavljanja lijeka na tržište uočena je klinički značajna hipotenzija u bolesnika koji su uz risperidon uzimali i antihipertenzive. Risperidon Grindeks potrebno je koristiti s oprezom u bolesnika s poznatim kardiovaskularnim bolestima (npr. srčano zatajenje, infarkt miokarda, smetnje provođenja, dehidracija, hipovolemija ili cerebrovaskularna bolest), a doziranje je potrebno postupno titrirati (vidjeti dio 4.2). Ako dođe do hipotenzije, potrebno je razmotriti smanjenje doze.

#### Leukopenija, neutropenija i agranulocitoza

Leukopenija, neutropenija i agranulocitoza bile su prijavljene uz antipsihotike, uključujući i risperidon. Tijekom postmarketinškog praćenja, agranulocitoza je bila prijavljena vrlo rijetko (< 1/10 000 bolesnika).

Bolesnike s klinički značajnjem sniženjem broja leukocita u povijesti bolesti ili leukopenijom/neutropenijom koja je izazvana lijekovima, treba pratiti tijekom prvih nekoliko mjeseci liječenja, a na prvi znak klinički značajnog pada leukocita, bez prisustva drugih uzročnih faktora, treba razmotriti prestanak uzimanja lijeka Risperidon Grindeks.

Bolesnike s klinički značajnom neutropenijom treba pažljivo pratiti zbog moguće vrućice ili drugih simptoma ili znakova infekcije, te ih hitno liječiti u slučaju pojave takvih simptoma ili znakova. Bolesnici s teškom neutropenijom (apsolutni broj neutrofila  $<1 \times 10^9/l$ ) trebaju prestati uzimati lijek Risperidon Grindeks, te im je potrebno pratiti leukocite do oporavka.

#### Tardivna diskinezija/ ekstrapiramidalni simptomi (TD/EPS)

Lijekovi koji imaju svojstva antagonista dopaminskih receptora povezani su s nastankom tardivne diskinezije, koja je obilježena ritmičkim nevoljnima pokretima, pretežno jezika i/ili lica. Pojava ekstrapiramidalnih simptoma predstavlja faktor rizika za razvoj tardivne diskinezije. Ako se pojave znakovi i simptomi tardivne diskinezije, potrebno je razmotriti prekid primjene svih antipsihotika.

Oprez je opravdan za pacijente koji istovremeno primaju oba psihostimulansa (na primjer metilfenidat) i risperidon s obzirom da se ekstrapiramidalni simptomi mogu pojaviti kod prilagodbe doze jednog ili oba lijeka. Preporučuje se postepeni prekid stimulativnog liječenja (vidjeti dio 4.5).

#### Neuroleptički maligni sindrom (NMS)

Zabilježeno je da se uz primjenu antipsihotika može javiti neuroleptički maligni sindrom, koji je karakteriziran hipertermijom, rigiditetom mišića, autonomnom nestabilnošću, promijenjenim stanjem svijesti i povиenim vrijednostima serumske kreatin fosfokinaze. Dodatni znakovi mogu uključivati mioglobinuru (rabdomiolizu) i akutno zatajenje bubrega. U tom slučaju potrebno je prekinuti primjenu svih antipsihotika, uključujući i lijek Risperidon Grindeks.

#### Parkinsonova bolest i demencija s Lewyjevim tjelešcima

Liječnik mora procijeniti odnos rizika i koristi kod propisivanja antipsihotika, uključujući i lijek Risperidon Grindeks, bolesnicima s Parkinsonovom bolešću ili demencijom s Lewyjevim tjelešcima. Parkinsonova bolest može se pogoršati uz primjenu risperidona. Obje skupine bolesnika mogu imati povećan rizik od razvoja neuroleptičkog malignog sindroma, kao i povećanu osjetljivost na antipsihotike; ovi bolesnici su bili isključeni iz kliničkih ispitivanja. Povećana osjetljivost na antipsihotike, osim ekstrapiramidalnim simptomima, može se manifestirati simptomima poput konfuzije, stanje smanjene svijesti i posturalne nestabilnosti s čestim padovima.

#### Hiperglikemija i dijabetes melitus

Hiperglikemija, dijabetes melitus i egzacerbacija već postojećeg dijabetesa bile su prijavljene tijekom liječenja risperidonom. U nekim slučajevima, prijavljeno je prethodno povećanje tjelesne težine, što bi moglo biti predisponirajući čimbenik. Povezanost s ketoacidozom prijavljena je vrlo rijetko, a rijetko s dijabetičkom komom. Savjetuje se odgovarajuće kliničko praćenje, sukladno uobičajenim smjernicama kod primjene antipsihotika. Bolesnike koji se liječe bilo kojim atipičnim antipsihotikom, uključujući lijekom Risperidon Grindeks, trebalo bi pratiti zbog simptoma hiperglikemije (kao što su polidipsija, poliurija, polifagija i slabost), a bolesnike s dijabetes melitusom trebalo bi redovito pratiti zbog pogoršanja kontrole glukoze.

#### Povećanje tjelesne težine

Značajno povećanje tjelesne težine prijavljeno je pri uzimanju risperidona. Tjelesnu težinu potrebno je redovito kontrolirati.

#### Hiperprolaktinemija

Hiperprolaktinemija je uobičajena nuspojava kod liječenja lijekom Risperidon Grindeks. Preporučuje se procjena razine prolaktina u plazmi u pacijenata s dokazanim mogućim nuspojavama povezanih s uzimanjem prolaktina (npr. ginekomastija, poremećaji menstrualnog ciklusa, anovulacija, poremećaj plodnosti, smanjeni libido, erektilna disfunkcija, galaktoreja).

Ispitivanja na kulturama stanica upućuju na to da bi prolaktin mogao stimulirati rast stanica tumora dojke u ljudi. Iako jasna povezanost s primjenom antipsihotika do sada nije bila pokazana u kliničkim i epidemiološkim ispitivanjima, preporučuje se oprez u bolesnika s relevantnom anamnezom. Risperidon Grindeks je potrebno primjenjivati s oprezom u bolesnika u kojih je već prisutna hiperprolaktinemija te u bolesnika s mogućim prolaktin ovisnim tumorom.

#### Produljenje QT intervala

Produljenje QT intervala vrlo je rijetko prijavljeno nakon stavljanja lijeka u promet. Kao i kod drugih antipsihotika, potreban je oprez kada se risperidon propisuje bolesnicima koji u povijesti bolesti imaju srčano-žilne bolesti, u bolesnika koji u obiteljskoj anamnezi imaju produljeni QT interval, u bolesnika s bradikardijom ili poremećajem elektrolita (hipokalemija, hipomagnezijemija) jer sva navedena stanja mogu povećati rizik od aritmogenog učinka. Oprez je potreban i u slučaju istodobne primjene lijekova za koje je poznato da produljuju QT interval.

#### Konvulzije

Risperidon Grindeks je potrebno primjenjivati s oprezom u bolesnika s epileptičkim napadajima u povijesti bolesti ili s drugim stanjima koja potencijalno snižavaju prag za pojavu napadaja.

#### Prijapizam

Zbog alfa adrenergičkog blokirajućeg učinka, risperidon može uzrokovati prijapizam.

#### Reguliranje tjelesne temperature

Antipsihotici mogu poremetiti sposobnost organizma da smanji tjelesnu temperaturu. Potreban je oprez kod propisivanja lijeka Risperidon Grindeks bolesnicima koji će biti izloženi uvjetima koji pridonose povišenju tjelesne temperature, npr. intenzivno vježbanje, izlaganje visokoj temperaturi, istodobna primjena lijekova s antikolinergičnim djelovanjem ili bi mogli biti izloženi uvjetima dehidracije.

#### Antiemetički učinak

U nekliničkim ispitivanjima risperidona opažen je antiemetički učinak. Ako se javi u ljudi, taj učinak može prikriti znakove i simptome predoziranja nekim lijekovima ili stanja poput opstrukcije crijeva, Reyevog sindroma i tumora mozga.

#### Oštećenje funkcije bubrega i jetre

U odnosu na odrasle s normalnom funkcijom bubrega, u bolesnika s oštećenjem funkcije s oštećenjem funkcije jetre dolazi do povećanja koncentracije slobodne frakcije risperidona u plazmi (vidjeti dio 4.2).

#### Venska tromboembolija

Prijavljeni su slučajevi venske tromboembolije (VTE) u bolesnika koji su liječeni antipsihoticima. Budući da bolesnici liječeni antipsihoticima često već imaju stečeni rizik za nastanak venske tromboembolije, potrebno je utvrditi sve moguće faktore rizika za vensku tromboemboliju prije ili tijekom liječenja lijekom Risperidon Grindeks te poduzeti preventivne mjere.

#### Intraoperacijski sindrom meke šarenice

Intraoperacijski sindrom meke šarenice (engl. *Intraoperative floppy iris syndrome*; IFIS), primjećen je tijekom operacije katarakte u bolesnika liječenih lijekovima koji imaju učinak alfa 1-adrenergičkih antagonistika, uključujući lijek Risperidon Grindeks (vidjeti dio 4.8).

IFIS može povećati rizik za nastanak komplikacija oka tijekom i nakon operacije. Prije operativnog zahvata, oftalmolog kirurg mora biti upoznat sa statusom trenutnog ili prethodnog uzimanja lijekova koji imaju učinak alfa 1a-adrenergičkih antagonistika. Potencijalna korist od prekida liječenja alfa 1-blokatorima prije operacije katarakte nije utvrđena, te mora biti procijenjena u odnosu na rizik vezan uz prekid antipsihotičkog liječenja.

#### Pedijatrijska populacija

Prije nego što se risperidon propiše djetetu ili adolescentu s poremećajem ponašanja, potrebno je procijeniti moguće tjelesne ili socijalne uzroke agresivnog ponašanja, kao što su bol ili neprimjereni zahtjevi okoline.

Sedativni učinak risperidona kod ove populacije potrebno je pomno pratiti, zbog mogućih utjecaja na sposobnost učenja. Promjena vremena primjene risperidona može poboljšati utjecaj sedacije na pažnju tijekom aktivnosti u djece i adolescenata.

Risperidon je bio povezan s porastom tjelesne težine i indeksa tjelesne mase (BMI). Preporučuju se mjerjenje početne vrijednosti težine prije liječenja i redoviti nadzor težine. Promjena visine tijekom dugoročnih kliničkih ispitivanja otvorenoga tipa bila je unutar očekivanih normi, sukladno dobnoj skupini. Utjecaj dugotrajnog uzimanja risperidona na spolno sazrijevanje i visinu nije bio odgovarajuće ispitivan.

S obzirom na potencijalni utjecaj prolongirane hiperprolaktinemije na rast i spolno sazrijevanje u djece i adolescenata, potrebno je razmotriti redovitu kliničku procjenu endokrinološkog statusa, uključujući mjerjenje visine, težine, spolnog sazrijevanja, praćenje menstrualne funkcije i drugih potencijalnih učinaka povezanih s prolaktinom.

Rezultati malog post-marketinškog istraživanja pokazali su da su subjekti izloženi risperidonu u dobi od 8 do 16 godina bili u prosjeku oko 3,0 do 4,8 cm viši od onih koji su dobili druge atipične anti-psihotične lijekove. Ovo ispitivanje nije bilo adekvatno da bi se utvrdilo je li izlaganje risperidonu imalo utjecaj na konačnu visinu odraslih, ili je li takav rezultat bio postignut zbog izravnog učinka risperidona na rast kostiju, ili zbog učinka osnovne bolesti na rast kostiju, ili rezultat bolje kontrole osnovne bolesti što je rezultiralo povećanjem linearног rasta.

Tijekom liječenja risperidonom potrebno je redovito pratiti javljaju li se ekstrapiramidalni simptomi ili drugi poremećaji pokreta.

Za ostale specifičnosti primjene u djece i adolescenata vidjeti dio 4.2.

#### Pomoćne tvari

Filmom obložena tableta sadrži laktozu. Bolesnici s rijetkim nasljednim poremećajem nepodnošenja galaktoze, potpunim nedostatkom laktaze ili malapsorpcijom glukoze i galaktoze ne bi smjeli uzimati ovaj lijek.

Filmom obložene tablete od 2 mg sadrže bojilo Sunset Yellow FCF (E110). Može izazvati alergijske reakcije.

Filmom obložene tablete od 4 mg sadrže bojilo tartrazin (E102). Može izazvati alergijske reakcije.

#### **4.5. Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija**

##### Interakcije povezane s farmakodinamikom

###### *Lijekovi za koje se zna da produljuju QT interval*

Kao i kod drugih antipsihotika, preporučuje se oprez kada se risperidon propisuje zajedno s lijekovima za koje je poznato da produljuju QT interval, kao što su antiaritmici (npr. kinidin, dizopiramid, prokainamid, propafenon, amiodaron, sotalol), triciklički antidepresivi (npr. amitriptilin), tetraciklički antidepresivi (npr. maprotilin), neki antihistaminici, drugi antipsihotici, neki antimalarici (npr. kinin i meflokin) te s lijekovima koji uzrokuju neravnotežu elektrolita (hipokalemija, hipomagnezijemija), bradikardiju ili onima koji inhibiraju jetreni metabolizam risperidona. Ovaj je popis indikativan, a ne iscrpan.

###### *Djelatne tvari koje djeluju na središnji živčani sustav i alkohol*

Risperidon je potrebno primjenjivati s oprezom u kombinaciji s drugim lijekovima koji djeluju na središnji živčani sustav, posebice s alkoholom, opijatima, antihistaminicima i benzodiazepinima zbog povećanog rizika od sedacije.

###### *Levodopa i dopaminski agonisti*

Risperidon Grindeks može antagonizirati učinke levodope i ostalih dopaminskih agonista. Ako je ova kombinacija neophodna, posebno u završnom stadiju Parkinsonove bolesti, potrebno je propisati najnižu učinkovitu dozu svakog lijeka.

###### *Lijekovi koji imaju hipotenzivni učinak*

Nakon stavljanja lijeka na tržište primijećena je klinički značajna hipotenzija kod istodobne primjene risperidona s antihipertenzivnom terapijom.

###### *Psihostimulansi*

Istodobna primjena psihostimulansa (npr. metilfenidata) i risperidona može dovesti do ekstrapiramidalnih simptoma nakon promjene u liječenju jednim ili s oba lijeka (vidjeti dio 4.4).

###### *Paliperidon*

Ne preporučuje se istodobna primjena oralnog lijeka Risperidon Grindeks s paliperidonom jer je paliperidon aktivni metabolit risperidona i kombinacija ta dva lijeka mogla bi dovesti do dodatne izloženosti djelatnoj frakciji s antipsihotičnim učinkom.

##### Interakcije povezane s farmakokinetikom

Hrana ne utječe na apsorpciju lijeka Risperidon Grindeks.

Risperidon se uglavnom metabolizira putem enzima CYP2D6, te u manjoj mjeri preko CYP3A4. I risperidon i njegov aktivni metabolit 9-hidroksirisperidon su supstrati P-glikoproteina (P-gp). Tvari koje modificiraju aktivnost CYP2D6, ili tvari koje snažno inhibiraju ili induciraju CYP3A4 i/ili P-gp aktivnost, mogu utjecati na farmakokinetiku djelatne frakcije s antipsihotičnim učinkom risperidona.

### *Jaki CYP2D6 inhibitori*

Istovremena primjena risperidona s jakim inhibitorom CYP2D6 može povećati koncentraciju risperidona u plazmi, ali manje u dijelu djelatne frakcije s antipsihotičnim učinkom risperidona. Veće doze jakog CYP2D6 inhibitora može povećati koncentracije djelatne frakcije s antipsihotičnim učinkom risperidona (npr paroksetin, vidjeti niže). Očekuje se da drugi CYP2D6 inhibitori, kao što je kinidin, mogu utjecati na koncentraciju risperidona u plazmi na sličan način. Kada se uvede ili prekine primjena paroksetina, kinidina ili drugog jakog CYP2D6 inhibitora, pogotovo pri većim dozama, liječnik treba ponovno procijeniti doziranje lijeka Risperidon Grindeks.

### *CYP3A4 i/ili P-gp inhibitori*

Istovremena primjena lijeka Risperidon Grindeks s jakim CYP3A4 i/ili P-gp inhibitorom može bitno povećati koncentraciju djelatne frakcije s antipsihotičnim učinkom risperidona u plazmi. Kada se uvede ili prekine istodobna primjena itrakonazola ili drugog jakog CYP3A4 i/ili P-gp inhibitora, liječnik treba ponovno procijeniti doziranje lijeka Risperidon Grindeks.

### *CYP3A4 i/ili P-gp induktori*

Istovremena primjena lijeka Risperidon Grindeks s jakim CYP3A4 i/ili P-gp induktorom može smanjiti koncentraciju djelatne frakcije s antipsihotičnim učinkom risperidona u plazmi. Kada se uvede ili prekine istodobna primjena karbamazepina ili drugog jakog CYP3A4 i/ili P-gp induktora, liječnik treba ponovno procijeniti doziranje lijeka Risperidon Grindeks. CYP3A4 induktori pokazuju učinak ovisno o vremenu, a to može trajati najmanje 2 tjedna do maksimalnog učinka nakon njihovog uvođenja. S druge strane, kod prekida primjene, potrebno je najmanje 2 tjedna da bi indukcija enzima CYP3A4 počela opadati.

### *Djelatne tvari koje snažno vežu proteine*

Kada se lijek Risperidon Grindeks uzima zajedno s djelatnim tvarima koje snažno vežu proteine, ne postoji klinički značajan pomak i jedne djelatne tvari od proteina u plazmi.

Kada se istodobno koriste preteći lijekovi, treba proučiti odgovarajuće informacije o lijeku za podatak o metabolizmu i mogućoj potrebi za prilagodbom doze.

### Pedijatrijska populacija

Ispitivanja interakcija provedena su samo u odraslih. Relevantnost rezultata tih istraživanja u pedijatrijskoj populaciji je nepoznat.

Kombinirana primjena psihostimulansa (npr. metilfenidat) s risperidonom u djece i adolescenata nije promijenila farmakokinetiku i djelotvornost risperidona.

### Primjeri

Primjeri lijekova koji potencijalno mogu stupati u interakcije ili oni koji ne pokazuju interakcije s risperidonom navedeni su u nastavku:

#### Utjecaj drugih lijekova na farmakokinetiku risperidona

Antibakterijski lijekovi:

- Eritromicin, umjereni CYP3A4 i P-gp inhibitor, ne mijenja farmakokinetiku risperidona i djelatne frakcije s antipsihotičnim učinkom.
- Rifampicin, jak CYP3A4 i P-gp induktor, smanjuje djelatne frakcije s antipsihotičnim učinkom risperidona u plazmi.

Antikolinesteraza:

- Donepezil i galantamin, supstrati enzima CYP2D6 i CYP3A4, ne pokazuju klinički značajan utjecaj na farmakokinetiku risperidona i djelatne frakcije s antipsihotičnim učinkom.

#### Antiepileptici:

- Karbamazepin, jaki CYP3A4 i P-gp induktor, smanjuje koncentraciju djelatne frakcije s antipsihotičnim učinkom risperidona u plazmi. Slični učinci mogu se opaziti i kod npr. fenitoina i fenobarbitala, koji također induciraju CYP3A4 enzime i P-glikoprotein.
- Topiramat neznatno smanjuje bioraspoloživost risperidona, ali ne djelatne frakcije s antipsihotičnim učinkom. Stoga se ne očekuje da ova interakcija bude od kliničkog značaja.

#### Lijekovi protiv gljivica:

- Itrakonazol, jaki CYP3A4 i P-gp inhibitor, pri dozi od 200 mg/dan povećava koncentraciju djelatne frakcije s antipsihotičnim učinkom u plazmi za otprilike 70 %, pri dozi risperidona od 2-8 mg/dan.
- Ketokonazol, jaki CYP3A4 i P-gp inhibitor, pri dozi od 200 mg/dan povećava koncentraciju risperidona u plazmi i smanjuje koncentraciju 9-hidroksirisperidona u plazmi.

#### Antipsihotici:

- Fenotiazini mogu povećati koncentraciju risperidona u plazmi, ali ne djelatne frakcije s antipsihotičnim učinkom.

#### Antivirusni lijekovi:

- Inhibitori proteaze: nema dostupnih formalnih podataka; međutim, budući da je ritonavir jak CYP3A4 inhibitor, a slab CYP2D6 inhibitor, ritonavir i ritonavirom potaknuti inhibitori proteaze potencijalno povećavaju koncentracije djelatne frakcije s antipsihotičnim učinkom risperidona.

#### Beta-blokatori:

- Neki beta-blokatori mogu povećati koncentraciju risperidona u plazmi, ali ne i koncentraciju djelatne frakcije s antipsihotičnim učinkom.

#### Blokatori kalcijevog kanala:

- Verapamil, umjereni CYP3A4 i P-gp inhibitor, povećava koncentraciju risperidona u plazmi i djelatne frakcije s antipsihotičnim učinkom

#### Gastrointestinalni lijekovi:

- Antagonisti H2-receptora: cimetidin i ranitidin, slab CYP2D6 i CYP3A4 inhibitori, povećavaju bioraspoloživost risperidona ali samo granično djelatnu frakciju s antipsihotičnim učinkom

#### Selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (engl. *selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI*) i triciklički atidepresivi:

- Fluoksetin, jaki CYP2D6 inhibitor, povećava koncentraciju risperidona u plazmi, ali manje u dijelu djelatne frakcije s antipsihotičnim učinkom.
- Paroksetin, jaki CYP2D6 inhibitor, povećava koncentraciju risperidona u plazmi, ali pri dozama do 20 mg/dan, manje u dijelu djelatne frakcije s antipsihotičnim učinkom. Iako, više doze paroksetina mogu povećati koncentraciju djelatne frakcije s antipsihotičnim učinkom risperidona.
- Triciklički antidepresivi mogu povećati koncentraciju risperidona u plazmi ali ne i onog u djelatnoj frakciji s antipsihotičnim učinkom. Amitriptilin ne utječe na farmakokinetiku risperidona ili na djelatnu frakciju s antipsihotičnim učinkom.
- Sertralin, slab inhibitor enzima CYP2D6 i fluvoksamin, slab inhibitor enzima CYP3A4 pri dozama do 100 mg/dan nisu povezani s klinički značajnim promjenama u koncentraciji djelatne frakcije s antipsihotičnim učinkom risperidona. Međutim, doze sertralina ili fluvoksamina veće od 100 mg/dan mogu povećati koncentraciju djelatne frakcije s antipsihotičnim učinkom risperidona.

#### Utjecaj risperidona na farmakokinetiku drugih lijekova

#### Antiepileptici:

- Risperidon ne pokazuje klinički značajan učinak na farmakokinetiku valproata ili topiramata.

#### Antipsihotici:

- Aripiprazol, supstrat enzima CYP2D6 i CYP3A4: risperidon tablete ili injekcije nisu utjecale na farmakokinetiku zbroja aripiprazola i njegovog aktivnog metabolita, dehidroaripiprazola.

#### Srčani glikozidi:

- Risperidon ne pokazuje klinički značajan učinak na farmakokinetiku digoksina.

Litij:

- Risperidon ne pokazuje klinički značajan učinak na farmakokinetiku litija.

#### Istodobna primjena risperidona i furosemida

- Vidjeti dio 4.4 vezano uz povećani mortalitet u starijih bolesnika s demencijom koji istodobno primaju furosemid.

### **4.6. Plodnost, trudnoća i dojenje**

#### Trudnoća

Nema dovoljno podataka vezanih uz primjenu risperidona u trudnica. U ispitivanjima na životinjama risperidon nije pokazao teratogeni učinak, ali su uočene druge vrste reproduktivne toksičnosti (vidjeti dio 5.3). Potencijalni rizik u ljudi nije poznat.

U novorođenčadi koja su tijekom trećeg tromjesečja trudnoće izložena antipsihoticima (uključujući risperidon), postoji rizik od pojave nuspojava koje uključuju ekstrapiramidalne i/ili simptome ustezanja, koje mogu varirati ovisno o težini i trajanju, nakon rođenja. Prijavljene su agitacija, hipertonija, hipotonija, tremor, somnolencija, respiratori distres i poremećaj hranjenja. Prema tome, novorođenčad je potrebno pažljivo nadzirati.

Risperidon Grindeks ne smije se upotrebljavati u trudnoći, osim ako to nije izrazito potrebno. Ako je neophodan prekid terapije tijekom trudnoće, to se ne smije učiniti naglo.

#### Dojenje

U istraživanjima na životinjama uočeno je kako se risperidon i 9-hidroksi-risperidon izlučuju u mlijeko. Također je uočeno kako se risperidon i 9-hidroksi-risperidon u malim količinama izlučuju i u majčino mlijeko. Nema podataka o nuspojavama u dojenčadi. Stoga je potrebno procijeniti odnos koristi dojenja i potencijalnog rizika za dijete.

#### Plodnost

Kao i drugi lijekovi koji antagoniziraju dopaminske D2 receptore, lijek Risperidon Grindeks podiže razinu prolaktina. Hiperprolaktinemija može suprimirati hipotalamički hormon GnRH i tako dovesti do smanjene sekrecije gonadotropina iz hipofize. Smanjujući gonadalnu steroidogenezu i u bolesnica i u muških bolesnika ovo povratno može inhibirati reproduktivnu funkciju.

U nekliničkim ispitivanjima nisu zabilježeni značajni učinci.

### **4.7. Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima**

Risperidon Grindeks može imati mali do umjeren utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima s obzirom na potencijalno djelovanje na živčani sustav i vid (vidjeti dio 4.8). Stoga je bolesnicima potrebno savjetovati da ne voze i ne upravljaju strojevima sve dok njihova osobna reakcija na ovaj lijek nije poznata.

### **4.8. Nuspojave**

Najčešće prijavljene nuspojave (s incidencijom  $\geq 10\%$ ) su: parkinsonizam, sedacija/sommolencija, glavobolja i nesanica.

Za nuspojave parkinsonizam i akatiziju čini se da su ovisne o dozi.

U tablici su navedene sve nuspojave zabilježene za risperidon u kliničkim ispitivanjima i nakon stavljanja lijeka u promet prema kategorijama učestalosti procijenjenim iz kliničkih ispitivanja s

risperidonom. Učestalost pojavljivanja definirana je kao: vrlo često ( $\geq 1/10$ ); često ( $\geq 1/100$  do  $< 1/10$ ); manje često ( $\geq 1/1000$  do  $< 1/100$ ); rijetko ( $\geq 1/10\ 000$  do  $< 1/1000$ ), vrlo rijetko ( $< 1/10\ 000$ ). i nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Unutar svake skupine učestalosti, nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

Klasa organskog sustava	Nuspojava na lijek					
	Učestalost					
	Vrlo često	Često	Manje često	Rijetko	Vrlo rijetko	Nepoznato
<b>Infekcije i infestacije</b>		pneumonija, bronhitis, infekcija gornjeg dišnog sustava, sinusitis, infekcija mokraćnog sustava, infekcija uha, gripa	infekcija dišnog sustava, cistitis, infekcija oka, tonsilitis, onihomikoza, infektivni lokalizirani celulitis, virusna infekcija, akarodermatitis	infekcija		
<b>Poremećaji krvi i limfnog sustava</b>			neutropenija, snižen broj bijelih krvnih stanica, trombocitopenija, anemija, snižen hematokrit, povišen broj eozinofila	agranulocitoza <sup>c</sup>		
<b>Poremećaji imunološkog sustava</b>			preosjetljivost	anafilaktička reakcija <sup>c</sup>		
<b>Endokrini poremećaji</b>		hiperprolaktinemija <sup>a</sup>		neadekvatna sekrecija antidiuretskog hormona, prisutnost glukoze u urinu		
<b>Poremećaji metabolizma i prehrane</b>		povećana težina, pojačan apetit, smanjen apetit	dijabetes melitus <sup>b</sup> , hiperglikemija, polidipsija, smanjena težina, anoreksija, povišeni kolesterol u krvi	intoksikacija vodom <sup>c</sup> , hipoglikemija, hiperinzulinemija <sup>c</sup> , povišeni trigliceridi u krvi	dijabetička ketoacidzoza	
<b>Psihijatrijski poremećaji</b>	insomnija <sup>d</sup>	poremećaj spavanja, agitacija, depresija, anksioznost	manija, stanje konfuzije, smanjen libido, nervoza, noćne more	katatonija, somnambulizam, poremećaj prehrane povezan sa snom, afektivna tupost, anorgasmija		
<b>Poremećaji živčanog sustava</b>	sedacija/ somnolencija parkinsonizam <sup>d</sup> , glavobolja	akatizija <sup>d</sup> , distonija <sup>d</sup> , omaglica, diskinezija <sup>d</sup> , tremor	tardivna diskinezija, cerebralna ishemija, neodgovaranje na podražaje, gubitak svijesti, deprimirana razina svijesti, konvulzije <sup>d</sup> , sinkopa, psihomotorna hiperaktivnost, poremećaj ravnoteže, abnormalna koordinacija, posturalna omaglica, poremećaj pozornosti, dizartrija, disgeuzija, hipoestezija, parestezija	neuroleptički maligni sindrom, cerebrovaskularni poremećaj, dijabetička koma, titubacija glave		

Klasa organskog sustava	Nuspojava na lijek					
	Učestalost					
	Vrlo često	Često	Manje često	Rijetko	Vrlo rijetko	Nepoznato
Poremećaji oka		zamagljen vid, konjunktivitis	fotofobija, suho oko, pojačana lakrimacija, okularna hiperemija	glaukom, poremećaj kretanja očiju, preokretanje očiju, kraste na rubu vjeđe, sindrom meke šarenice (intraoperacijski) <sup>c</sup>		
Poremećaji uha i labirinta			vertigo, tinitus, bol u uhu			
Srčani poremećaji		tahikardija	fibrilacija atrija, atrioventrikularni blok, poremećaj provođenja, produljeni QT interval na elektrokardiogramu, bradikardija, abnormalnosti u elektrokardiogramu, palpitacije	sinusna aritmija		
Krvožilni poremećaji		hipertenzija	hipotenzija, ortostatska hipotenzija, navale crvenila	plućna embolija, venska tromboza		
Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja		dispneja, faringolaringealna bol, kašalj, epistaksia, nazalna kongestija	aspiracijska pneumonija, kongestija pluća, kongestija dišnog sustava, krepitacije, piskanje, disfonija, respiratorni poremećaj	sindrom apneje za vrijeme spavanja, hiperventilacija		
Poremećaji probavnog sustava		bol u abdomenu, nelagoda u abdomenu, povraćanje, mučnina, konstipacija, proljev, dispepsija, suha usta, zubobolja	inkontinencija stolice, fekaloma, gastroenteritis, disfagija, flatulencija	pankreatitis, opstrukcija crijeva, otečen jezik, heilitis	ileus	
Poremećaji kože i potkožnog tkiva		osip, eritem	urtikarija, pruritus, alopecija, hiperkeratoza, ekcem, suha koža, promjena boje kože, akne, seboroični dermatitis, poremećaj kože, kožne lezije	osip izazvan lijemom, perut	angioedem	Stevens-Johnsonov sindrom/ toksična epidermalna nekroliza <sup>c</sup>
Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva		mišićni spazmi, mišićno-koštana bol, bol u ledima, artralgija	povišena kreatin fosfokinaza u krvi, abnormalno držanje, ukočenost zglobova, oticanje zglobova, mišićna slabost, bol u vratu	rabdomioliza		
Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava		urinarna inkontinencija	polakizurija, urinarna retencija, dizurija			
Stanja vezana uz trudnoću, babinje i perinatalno razdoblje				neonatalni sindrom ustezanja lijeka <sup>c</sup>		

Klasa organskog sustava	Nuspojava na lijek					
	Učestalost					
	Vrlo često	Često	Manje često	Rijetko	Vrlo rijetko	Nepoznato
Poremećaji reproduktivnog sustava i dojki			erektilna disfunkcija, poremećaj ejakulacije, amenoreja, poremećaj menstruacije <sup>d</sup> , ginekomastija, galaktoreja, spolna disfunkcija, bol u dojkama, nelagoda u dojkama, vaginalni iscјedak	priјapizam <sup>c</sup> , zakašnjela menstruacija, nabreklost dojki, povećanje dojki, iscјedak iz dojki		
Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene		edem <sup>d</sup> , pireksija, bol u prsim, astenija, umor, bol	edem lica, zimica, povišena tjelesna temperatura, abnormalan hod, žđ, nelagoda u prsim, opća slabost, nenormalni osjećaj, nelagoda	hipotermija, snižena tjelesna temperatura, periferna hladnoća, sindrom uestezanja lijeka, induracija <sup>c</sup>		
Poremećaji jetre i žuči			povišene transaminaze, povišena gama-glutamiltransferaza, povišeni jetreni enzimi	žutica		
Ozljede, trovanja i proceduralne komplikacije		pad	proceduralna bol			

- a Hiperprolaktinemija može u nekim slučajevima dovesti do ginekomastije, poremećaja menstrualnog ciklusa, amenoreje, anovulacije, galaktoreje, poremećaj plodnosti, smanjenog libida, erektilne disfunkcije.
- b U placebo-kontroliranim ispitivanjima dijabetes melitus bio je prijavljen u 0,18% ispitanika liječenih risperidonom u usporedbi sa stopom od 0,11% u placebo skupini. Ukupna incidencija iz svih kliničkih ispitivanja bila je 0,43% u svih ispitanika liječenih risperidonom.
- c Nije primijećeno u kliničkom ispitivanjima, ali je primijećeno u postmarketinškom okruženju.
- d Ekstrapiramidalni poremećaj može se javiti kao: **Parkinsonizam** (hipersekrecija sline, mišićno-koštana ukočenost, parkinsonizam, slijenje, fenomen "zupčaste ukočenosti", bradikinezija, hipokinezija, izraz lica u obliku maske, mišićna napetost, akinezija, nuhalni rigiditet, rigiditet mišića, hod tipičan za parkinsonizam te abnormalni glabelarni refleks, parkinsonični tremor u mirovanju), **akatizija** (akatizija, nemir, hiperkinezija te sindrom nemirnih nogu), tremor, **diskinezija** (diskinezija, mišićni trzaji, koreoatetoza, atetoza i mioklonus), distonija.

**Distonija** uključuje distoniju, hipertoniju, tortikolis, nevoljne mišićne kontrakcije, kontrakture mišića, blefarospazam, okulogiraciju, paralizu jezika, spazam lica, laringospazam, miotoniju, opistotonus, orofaringealni spazam, pleurotonus, spazam jezika te trizmus. Potrebno je napomenuti da je uključen širi spektar simptoma koji ne moraju nužno biti ekstrapiramidalnog porijekla. **Insomnija** uključuje inicijalnu insomniju, srednju insomniju. **Konvulzija** uključuje grand mal konvulziju. **Menstrualni poremećaj** uključuje nepravilnosti menstruacije, oligomenoreju. **Edem** uključuje generalizirani edem, periferni edem, tjestasti edem.

#### Nuspojave zabilježene s formulacijama paliperidona

Paliperidon je aktivni metabolit risperidona, stoga je profil nuspojava ovih tvari (uključujući oralne formulacije i one koje se primjenjuju injekcijom) međusobno povezan. Dodatno, uz iznad navedene nuspojave, sljedeće nuspojave zabilježene su pri uzimanju lijekova s paliperidonom te se mogu očekivati uz risperidon.

## **Srčani poremećaji**

Sindrom posturalne ortostatske tahikardije.

### *Učinak skupine lijekova*

Kao i kod drugih antipsihotika, tijekom postmarketinškog praćenja risperidona prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi produljenja QT intervala. Drugi učinci na srce povezani s učinkom skupine antipsihotika koji su doveli do produljenja QT intervala uključivali su ventrikularnu aritmiju, ventrikularnu fibrilaciju, ventrikularnu tahikardiju, iznenadnu smrt, srčani zastoj i aritmiju torsades de pointes.

### **Venska tromboembolija**

Prijavljeni su slučajevi venske tromboembolije, uključujući slučajeve plućne embolije i duboke venske tromboze, kod primjene antipsihotika (nepoznata učestalost nuspojave).

### **Povećanje tjelesne težine**

Udio odraslih shizofrenih bolesnika liječenih risperidonom i placebom, koji su dostigli kriterij porasta tjelesne težine  $\geq 7\%$  bio je usporen u 6-8-tjednim placebom kontroliranim ispitivanjima, pri čemu je pokazana statistički značajna incidencija porasta tjelesne težine u bolesnika liječenih risperidonom (18%) u odnosu na placebo skupinu (9%). Podaci dobiveni iz placebom kontroliranih trojednih kliničkih ispitivanja u bolesnika s akutnom manijom, pokazali su da je incidencija porasta tjelesne težine  $\geq 7\%$  na kraju ispitivanja bila slična u skupini koja je primala risperidon (2,5%) i placebo skupini (2,4%), a neznatno viša u skupini s aktivnom kontrolom (3,5%).

U dugotrajnim kliničkim ispitivanjima u populaciji djece i adolescenata s poremećajem ponašanja, došlo je do prosječnog porasta tjelesne mase od 7,3 kg nakon 12-mjesečnog liječenja. Očekivani porast tjelesne težine u djece u dobi 5-12 godina iznosi 3 do 5 kg godišnje. U dobroj skupini 12- 16 godina ovaj porast iznosi 3-5 kg godišnje za djevojčice, a u dječaka približno 5 kg godišnje.

### Dodatne informacije vezane uz posebne populacije

Nuspojave koje su prijavljene s većom incidencijom u starijih osoba s demencijom ili pedijatrijskih bolesnika u odnosu na odraslu populaciju opisane su niže:

#### *Stariji bolesnici s demencijom*

Tranzitorne ishemische atake i cerebrovaskularni događaji prijavljeni su u kliničkim ispitivanjima s učestalošću od 1,4%, odnosno 1,5% u starijih bolesnika s demencijom. Također, sljedeće nuspojave prijavljene su s učestalošću  $\geq 5\%$  u starijih bolesnika s demencijom i s barem dvostruko većom učestalošću nego kod ostale odrasle populacije: infekcija urinarnog sustava, periferni edem, letargija i kašalj.

#### *Pedijatrijska populacija*

Općenito, očekuje se da će vrsta nuspojava u djece biti slična onima primijećenima u odraslih. Sljedeće nuspojave prijavljene su s učestalošću  $\geq 5\%$  u pedijatrijskih bolesnika (5-17 godina starosti) i s barem dvostruko većom učestalošću nego tijekom kliničkih ispitivanja u odraslim: somnolencija/sedacija, umor, glavobolja, pojačan apetit, povraćanje, infekcije gornjih dišnih putova, nazalna kongestija, bol u abdomenu, omaglica, kašalj, pireksija, tremor, dijareja i enureza. Učinak dugotrajnog liječenja risperidonom na spolno sazrijevanje i visinu nije dovoljno ispitana (vidjeti dio 4.4, pododjeljak "Pedijatrijska populacija").

### Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: [navedenog u Dodatku V.](#)

#### 4.9. Predoziranje

##### *Simptomi*

Općenito, prijavljeni znakovi i simptomi posljedica su pretjerano izraženih poznatih farmakoloških učinaka risperidona. Oni uključuju omamljenost i sedaciju, tahikardiju i hipotenziju te ekstrapiramidalne simptome. U slučajevima predoziranja prijavljeni su i produljenje QT intervala i konvulzije. Torsade de pointes bila je prijavljena u vezi s istodobnim predoziranjem risperidonom i paroksetinom.

U slučaju akutnog predoziranja, potrebno je razmotriti mogućnost da se radi o većem broju korištenih lijekova.

##### *Liječenje*

Potrebno je osigurati i održavati prohodnost dišnih putova te omogućiti odgovarajuću oksigenaciju i ventilaciju. Potrebno je razmotriti primjenu aktivnog ugljena zajedno s laksativom, ali samo ako je od ingestije lijeka prošlo manje od jednog sata. Odmah je potrebno započeti s praćenjem kardiovaskularne funkcije, uključujući i trajno elektrokardiografsko praćenje, kako bi se otkrile moguće aritmije.

Za lijek Risperidon Grindeks ne postoji specifični antidot. Stoga je potrebno uvesti odgovarajuće potporne mjere. Hipotenziju i cirkulatorni kolaps potrebno je liječiti odgovarajućim mjerama kao što je intravenska nadoknada tekućine i/ili simpatomimetici. U slučaju jakih ekstrapiramidalnih simptoma, potrebno je primijeniti antikolinergičke lijekove. Bolesnika je potrebno dalje strogo liječnički nadzirati i pratiti sve do oporavka.

### 5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

#### 5.1. Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: ostali antipsihotici, ATK oznaka: N05AX08

##### Mehanizam djelovanja

Risperidon je selektivni monoaminergični antagonist jedinstvenih svojstava. Posjeduje visoki afinitet za serotoninergičke 5-HT<sub>2</sub> i dopaminergičke D<sub>2</sub> receptore. Risperidon se također veže na alfa<sub>1</sub>-adrenergičke receptore i, manjim afinitetom, na H<sub>1</sub>-histaminergičke i alfa<sub>2</sub>-adrenergičke receptore. Risperidon nema afinitet prema kolinergičkim receptorima. Iako je risperidon snažan D<sub>2</sub>-antagonist, uslijed čega se smatra da povoljno djeluje na pozitivne simptome shizofrenije, on u manjoj mjeri utječe na smanjenje motoričke aktivnosti i nastanak katalepsije nego klasični antipsihotici. Zbog uravnoteženog središnjeg antagonizma serotonina i dopamina može se smanjiti vjerojatnost ekstrapiramidalnih nuspojava te proširiti terapijsko djelovanje na negativne i afektivne simptome shizofrenije.

##### Farmakodinamički učinci

##### Klinička djelotvornost

##### *Shizofrenija*

Učinkovitost risperidona u kratkotrajnom liječenju shizofrenije utvrđena je u četiri klinička ispitivanja, u trajanju od 4 do 8 tjedana, koja su uključila više od 2500 bolesnika koji su zadovoljili DSM-IV kriterije za shizofreniju. U 6-tjednom placebo kontroliranom kliničkom ispitivanju koje je uključivalo titraciju risperidona do doze od 10 mg/dan primijenjenom dva puta na dan, risperidon se pokazao boljim u odnosu na placebo prema ukupnom rezultatu „Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)“. U placebo kontroliranom kliničkom ispitivanju u trajanju od 8 tjedana koje je uključivalo četiri nepromjenjive doze risperidona (2, 6, 10 i 16 mg/dan primijenjeno dva puta na dan), sve 4 skupine liječene risperidonom bile su bolje od skupine na placebo prema ukupnom zbroju PANSS skale (skala pozitivnih i negativnih sindroma). U 8-tjednom kliničkom ispitivanju usporednih doza koje je uključivalo 5 nepromjenjivih doza risperidona (1, 4, 8, 12 i 16 mg/dan, primijenjeno dva puta na dan), skupine liječene sa 4, 8 i 16 mg risperidona na dan imale su bolji rezultat od skupine liječene sa 1 mg risperidona prema ukupnom PANSS zbroju. U 4-tjednom placebo kontroliranom usporednom kliničkom ispitivanju koje je uključivalo dvije nepromjenjive doze risperidona (4 i 8 mg/dan, primijenjeno jedanput na dan), obje skupine na risperidonu bile su bolje od skupine na placebo u nekoliko PANSS mjerjenja, uključujući i ukupni PANSS te mjerjenje odgovora (>20% sniženje u ukupnom PANSS zbroju). U dugotrajnjem kliničkom ispitivanju, odrasli bolesnici koji su zadovoljavali DSM-IV kriterij za shizofreniju i koji su bili klinički stabilni na antipsihotičkoj terapiji tijekom zadnja 4 tjedna, randomizirani su u skupinu koja je dobivala risperidon 2 do 8 mg/dan ili u skupinu koja je primala haloperidol tijekom 1 do 2 godine uz praćenje relapsa. Bolesnici koji su primali risperidon doživjeli su značajno dulje vrijeme bez relapsa tijekom praćenja u usporedbi s bolesnicima koji su primali haloperidol.

#### *Manične epizode u bipolarnom poremećaju*

Djelotvornost monoterapije risperidonom u akutnom liječenju maničnih epizoda povezanih s bipolarnim poremećajem tipa I, pokazana je u tri dvostruko slijepa, placebom kontrolirana klinička ispitivanja monoterapije u približno 820 bolesnika s bipolarnim poremećajem tipa I prema DSM-IV klasifikaciji. U tri ispitivanja, liječenje risperidonom u dozi 1 mg do 6 mg/dan (početna doza bila je 3 mg u dva ispitivanja te 2 mg u jednom ispitivanju), pokazalo je značajno bolje rezultate u odnosu na placebo u prethodno definiranom primarnom ishodu, tj. promjeni ukupnog zbroja prema Youngovoj skali vrednovanja manije (YMRS) u 3. tjednu u odnosu na početne vrijednosti. Sekundarni ishodi koji su procjenjivali djelotvornost bili su konzistentni u odnosu na primarni ishod. Postotak bolesnika sa smanjenjem  $\geq 50\%$  ukupnog YMRS zbroja u 3. tjednu u odnosu na početnu vrijednost bio je značajno viši u skupini na risperidonu nego na placebo. Jedno od tri klinička ispitivanja uključivalo je skupinu s haloperidolom, kao i 9-tjednu dvostruko slijepu fazu održavanja. Djelotvornost je bila održana tijekom 9- tjednog vremena održavanja. Promjena u odnosu na početne vrijednosti YMRS pokazuje neprekidno poboljšanje, koje je bilo usporedivo kod risperidona i haloperidola u 12. tjednu.

Djelotvornost risperidona kao dodatka stabilizatorima raspoloženja u liječenju akutne manije pokazana je u jednom od dva dvostruko slijepa 3-tjedna klinička ispitivanja u približno 300 bolesnika koji su zadovoljili DSM-IV kriterij za bipolarni poremećaj tipa I. U prvom 3-tjednom ispitivanju, risperidon u dozi od 1 do 6 mg/dan, s početnom dozom od 2 mg na dan, kao dodatak litiju ili valproatu pokazao je bolji rezultat od monoterapije valproatom ili litijem u prethodno definiranom primarnom ishodu, tj. promjeni ukupnog zbroja YMRS u 3. tjednu u odnosu na početne vrijednosti. U drugom 3-tjednom ispitivanju, risperidon u dozi od 1 do 6 mg/ dan s početnom dozom od 2 mg, kao dodatak litiju, valproatu ili karbamazepinu pokazao je rezultat koji nije bio bolji od monoterapije litijem, valproatom ili karbamazepinom u sniženju ukupnog YMRS zbroja. Moguće objašnjenje lošijeg rezultata u ovom ispitivanju je pojačani klirens risperidona i 9-hidroksi-risperidona zbog djelovanja karbamazepina, što dovodi do subterapijskih koncentracija risperidona i 9-hidroksi-risperidona. Kada je karbamazepsinska skupina isključena u post-hoc analizi, risperidon u kombinaciji s litijem ili valproatom pokazao je bolji rezultat od monoterapije litijem ili valproatom u sniženju ukupnog YMRS zbroja.

#### *Perzistentna agresija u demenciji*

Djelotvornost risperidona u liječenju bihevioralnih i psiholoških simptoma demencije (BPSD), koji uključuju poremećaje ponašanja poput agresije, agitacije, psihote, aktivnosti i afektivne poremećaje,

prikazana je u tri dvostruko slijepa, placebo kontrolirana klinička ispitivanja u 1150 starijih bolesnika s umjerenom do teškom demencijom. Jedno ispitivanje uključilo je nepromjenjive doze risperidona od 0,5;1 i 2 mg/dan. Dva klinička ispitivanja s promjenjivom dozom uključivala su skupine liječene risperidonom u rasponima od 0,5 do 4 mg/dan te 0,5 do 2 mg/dan. Risperidon je pokazao statistički značajnu i klinički važnu učinkovitost u liječenju agresije i manje konzistentnu u liječenju agitacije i psihoze u starijih dementnih bolesnika (mjereno prema skali za mjerjenje behavioralne patologije u Alzheimerovoj bolesti [engl. BEHAVEAD, Behavioral Pathology in Alzheimer's Disease Rating Scale] i Cohen-Mansfield Agitation Inventory [CMAI]). Učinak liječenja risperidonom bio je neovisan o Mini-Mental State Examination (MMSE) zbroju (i posljedično o težini demencije), sedativnom učinku risperidona, prisutnosti ili odsutnosti psihoze te o vrsti demencije: Alzheimerove, vaskularne ili kombinirane (vidjeti također dio 4.4).

#### Pedijatrijska populacija

##### Poremećaj ponašanja

Djelotvornost risperidona u kratkotrajnom liječenju poremećaja ponašanja pokazana je u dva dvostruko slijepa, placebo kontrolirana klinička ispitivanja u približno 240 bolesnika dobne skupine 5 do 12 godina s dijagnosticiranim poremećajem u ponašanju (DBP) prema DSM-IV te graničnim mentalnim sposobnostima ili blagom do umjerenom retardacijom/poremećajem učenja. U dva klinička ispitivanja, risperidon u dozi od 0,02 do 0,06 mg/kg/ dan pokazao se značajno boljim od placebo, u prethodno definiranom primarnom ishodu, tj. promjeni u skali poteškoća u ponašanju prema Nisonger-Child Behaviour Rating Form (N-CBRF) u 6. tjednu u odnosu na početne vrijednosti.

## **5.2. Farmakokinetička svojstva**

Risperidon oralna otopina bioekivalentna je risperidon filmom obloženim tabletama.

Risperidon se metabolizira u 9-hidroksi-risperidon, koji farmakološki djeluje slično kao i risperidon (vidjeti dio „*Biotransformacija i eliminacija*“).

#### Apsorpcija

Risperidon se nakon oralne primjene u potpunosti apsorbira i u roku od 1 do 2 sata postiže vršne koncentracije u plazmi. Apsolutna oralna bioraspoloživost risperidona iznosi 70% (CV=25%). Relativna oralna bioraspoloživost risperidona iz tableta iznosi 94% (CV=10%) u usporedbi s otopinom. Hrana ne utječe na apsorpciju risperidona, stoga se može uzimati s ili bez hrane. U većine bolesnika stanje dinamičke ravnoteže risperidona postiže se nakon 1 dana, a 9-hidroksi-risperidona nakon 4-5 dana primjene.

#### Distribucija

Distribucija risperidona je brza. Volumen distribucije iznosi 1-2 l/kg. Risperidon se u plazmi veže na albumin i alfa-1-kiseli glikoprotein. Vezanje risperidona na bjelančevine plazme iznosi 90%, a 9-hidroksi-risperidona 77%.

#### Biotransformacija i eliminacija

Risperidon se metabolizira pomoću izoenzima citokroma CYP2D6 u 9-hidroksi-risperidon, koji ima sličnu farmakološku aktivnost kao i risperidon. Risperidon i 9-hidroksi-risperidon predstavljaju djelatnu frakciju s antipsihotičkim učinkom. CYP2D6 podložan je genetskom polimorfizmu. Brzi CYP2D6 metabolizatori brzo pretvaraju risperidon u 9-hidroksi-risperidon, dok ga slabiji metabolizatori pretvaraju znatno sporije. Unatoč tome što brzi metabolizatori imaju manju koncentraciju risperidona i više 9-hidroksi-risperidona od slabih metabolizatora, farmakokinetika kombinacije risperidona i 9-hidroksi-risperidona (tj. djelatna frakcija s antipsihotičnim učinkom), nakon jednokratne i višestrukih doza slična je u jakih i slabih metabolizatora CYP2D6.

Drugi metabolički put risperidona je N-dealkilacija. *In vitro* ispitivanja na mikrosomima ljudske jetre

pokazuju da risperidon u klinički relevantnoj koncentraciji ne inhibira značajno metabolizam lijekova metaboliziranih putem citokrom P450 izozima, uključujući CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8/9/10, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 i CYP3A5. Jedan tjedan nakon primjene risperidona, 70% doze izluci se urinom i 14% stolicom. U urinu, risperidon i 9-hidroksi-risperidon predstavljaju 35-45%, oralno primjenjene doze. Ostalo su inaktivni metaboliti. Nakon oralne primjene u psihotičnih bolesnika, poluvrijeme eliminacije risperidona iznosi oko 3 sata. Poluvrijeme eliminacije 9-hidroksi-risperidona i djelatne frakcije s antipsihotičkim učinkom iznosi 24 sata.

#### Linearost/nelinearnost

Kod primjene doza koje su unutar terapijskog raspona, koncentracije risperidona u plazmi razmjerne su dozi.

#### Stariji bolesnici, oštećenje jetre i bubrega

Farmakokinetičko ispitivanje jedne doze s oralnim risperidonom pokazao je u starije populacije prosječno 43% višu koncentraciju djelatne frakcije s antipsihotičkim učinkom u plazmi, 38% dulje poluvrijeme te za 30% manji klirens djelatne frakcije s antipsihotičkim učinkom.

U odraslih s umjerenom bolesti bubrega klirens aktivnog oblika lijeka iznosio je približno 48% u odnosu na klirens u mlađih zdravih odraslih osoba. U odraslih s teškom bolesti bubrega klirens aktivnog oblika lijeka je iznosio približno 31% u odnosu na klirens kod mlađih zdravih odraslih osoba. Poluvrijeme aktivnog oblika lijeka je 16,7 sati u mlađih odraslih osoba, 24,9 sati u odraslih s umjerenom bolesti bubrega (ili ~ 1,5 puta u odnosu na mlađe odrasle osobe), i 28,8 sati u osoba s teškom bolesti bubrega (ili ~ 1,7 puta u odnosu na mlađe odrasle osobe). U bolesnika s oštećenjem jetre, koncentracija risperidona u plazmi bila je normalna, ali je srednja vrijednost slobodne frakcije risperidona u plazmi bila povišena za 37,1%.

Oralni klirens i vrijeme polueliminacije risperidona i aktivnog oblika lijeka u odraslih osoba s umjerenim i teškim oštećenjem jetre nisu bili značajno različiti od parametara u mlađih zdravih odraslih osoba.

#### Pedijatrijska populacija

Farmakokinetika risperidona i 9-hidroksi-risperidona te djelatne frakcije s antipsihotičkim učinkom u djece slična je kao u odraslih.

#### Spol, rasa i navika pušenja

Farmakokinetičkom analizom populacije uočeno je da spol, rasa ili navika pušenja ne utječu na farmakokinetiku risperidona ili djelatnu frakciju s antipsihotičkim učinkom.

### **5.3. Neklinički podaci o sigurnosti primjene**

U ispitivanjima (sub)kronične toksičnosti, u kojima je doziranje započeto u spolno nezrelim štakora i pasa, učinci ovisni o dozi bili su prisutni u genitalnom traktu i mlijecnim žlijezdama mužjaka i ženki. Ovi učinci bili su povezani uz povišene razine prolaktina u serumu, što je posljedica blokirajućeg djelovanja risperidona na dopaminske D<sub>2</sub> receptore. Dodatno, ispitivanja na kulturi stanica upućuju na to kako bi prolaktin mogao stimulirati rast stanica humanog karcinoma dojke. Risperidon nije bio teratogen za štakore i zečeve. U ispitivanjima reproduktivne toksičnosti s risperidonom na štakorima, primjećene su štetni učinci na ponašanje pri parenju te na okotnu težinu i preživljivanje mladunčadi. Kod štakora, intrauterina izloženost risperidonu bila je povezana s kognitivnim deficitima u odrasloj dobi. Drugi antagonisti dopamina, kada su bili primjenjeni na skotnim životnjama, prouzrokovali su negativan učinak na učenje i razvoj motorike mladunčadi. U ispitivanju toksičnosti na mlađim štakorima, primjećena je povećana smrtnost mladunčadi i kašnjenje u fizičkom razvoju. U 40-

tjednom ispitivanju s mladim psima, odgođeno je spolno sazrijevanje. Na temelju površine ispod krivulje (AUC), nije bilo učinka na rast dugih kostiju kod pasa pri 3,6 puta većoj od maksimalne izloženost kod ljudi u adolescenata (1,5 mg/dan); dok su učinci na duge kosti i spolno sazrijevanje uočeni kod 15 puta maksimalne izloženosti u adolescenata.

U baterijama testova risperidon nije bio genotoksičan. Kod oralnih ispitivanja karcinogenosti risperidona na štakorima i miševima, primijećeno je povećanje adenoma hipofize (kod miševa), endokrinog adenoma pankreasa (kod štakora) i adenoma mlječnih žlijezda (kod obje vrste). Ovi tumori mogu biti povezani s produljenim antagonizmom na dopaminskim D<sub>2</sub>-receptorima i hiperprolaktinemijom. Značaj ovih nalaza kod glodavaca u smislu rizika za ljude nije poznat. *In vitro* i *in vivo* životinjski modeli pokazali su da visoke doze risperidona mogu uzrokovati produljenje QT intervala, što je bilo povezano s teoretski povećanim rizikom od torsade de pointes u bolesnika.

## 6. FARMACEUTSKI PODACI

### 6.1. Popis pomoćnih tvari

#### Jezgra tablete:

Laktoza  
Celuloza, mikrokristalična (E460)  
Kukuruzni škrob  
Magnezijev stearat (E572)

#### Ovojnica

*Risperidon Grindeks 0.5 mg filmom obložene tablete:*  
Makrogolpoli(vinilni alkohol), kopolimer, graftirani (E1209)  
Talk (E553b)  
Titanijev dioksid (E171)  
Glicerolkaprilokaprat (E471)  
Poli(vinilni alkohol) (E1203)  
Željezov oksid crveni (E172)  
Željezov oksid žuti (E172)

*Risperidon Grindeks 1 mg filmom obložene tablete:*  
Makrogolpoli(vinilni alkohol), kopolimer, graftirani (E1209)  
Talk (E553b)  
Titanijev dioksid (E171)  
Glicerolkaprilokaprat (E471)  
Poli(vinilni alkohol) (E1203)

*Risperidon Grindeks 2 mg filmom obložene tablete:*  
Makrogolpoli(vinilni alkohol), kopolimer, graftirani (E1209)  
Talk (E553b)  
Titanijev dioksid (E171)  
Glicerolkaprilokaprat (E471)  
Poli(vinilni alkohol) (E1203)  
Sunset Yellow FCF aluminum lake (E110)  
Quinoline Yellow aluminum lake (E104)

*Risperidon Grindeks 3 mg filmom obložene tablete:*  
Makrogolpoli(vinilni alkohol), kopolimer, graftirani (E1209)  
Talk (E553b)  
Titanijev dioksid (E171)  
Glicerolkaprilokaprat (E471)

Poli(vinilni alkohol) (E1203)

Željezov oksid žuti (E172)

Željezov oksid crni (E172)

*Risperidon Grindeks 4 mg filmom obložene tablete:*

Makrogolpoli(vinilni alkohol), kopolimer, graftirani (E1209)

Talk (E553b)

Titanijev dioksid (E171)

Glicerolkaprilokaprat (E471)

Poli(vinilni alkohol) (E1203)

Tartrazine aluminum lake (E102)

Indigo carmine aluminum lake (E132)

*Risperidon Grindeks 6 mg filmom obložene tablete:*

Makrogolpoli(vinilni alkohol), kopolimer, graftirani (E1209)

Talk (E553b)

Titanijev dioksid (E171)

Glicerolkaprilokaprat (E471)

Poli(vinilni alkohol) (E1203)

Željezov oksid žuti (E172)

Željezov oksid crveni (E172)

## **6.2. Inkompatibilnosti**

Nije primjenjivo.

## **6.3. Rok valjanosti**

2 godine.

## **6.4. Posebne mjere pri čuvanju lijeka**

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

## **6.5. Vrsta i sadržaj spremnika**

PVC/PVdC//Alu blisteri koji sadrže 20, 30, 60 ili 100 filmom obloženih tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

## **6.6. Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom**

Nema posebnih zahtjeva za zbrinjavanje.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

## **7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET**

GRINDEKS AS

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057

Latvija

Telefon: +371 67083205

E-mail: grindeks@grindeks.com

## **8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET**

H A L M E D  
17 - 05 - 2024  
O D O B R E N O

Risperidon Grindeks 0,5 mg filmom obložene tablete: HR-H-765127468  
Risperidon Grindeks 1 mg filmom obložene tablete: HR-H-561174770  
Risperidon Grindeks 2 mg filmom obložene tablete: HR-H-964401590  
Risperidon Grindeks 3 mg filmom obložene tablete: HR-H-123984646  
Risperidon Grindeks 4 mg filmom obložene tablete: HR-H-730413911  
Risperidon Grindeks 6 mg filmom obložene tablete: HR-H-910067333

**9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA**

Datum prvog odobrenja: 24. kolovoza 2023./

**10. DATUM REVIZIJE TEKSTA**

03.05.2024.

H A L M E D  
17 - 05 - 2024  
O D O B R E N O