

## SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA

### 1. NAZIV LIJEKA

Semquest 6 mg/0,4 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

### 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka tableta sadrži sloj sa 6 mg solifenacinsukcinata, što odgovara 4,5 mg solifenacina, i sloj s 0,4 mg tamsulozinklorida, što odgovara 0,37 mg tamsulozina.

Za cijeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

### 3. FARMACEUTSKI OBLIK

Tableta s prilagođenim oslobađanjem

Svaka tableta je crvena, filmom obložena, okrugla, promjera 9 mm, bikonveksna s utisnutom oznakom "6 04" na jednoj strani.

### 4. KLINIČKI PODACI

#### 4.1 Terapijske indikacije

Liječenje umjerenih do teških simptoma zadržavanja mokraće (neodgodiva potreba za mokrenjem, povećana učestalost mokrenja) i simptoma pražnjenja mokraćnog mjehura udruženih s benignom hiperplazijom prostate (BHP) u muškaraca koji nemaju adekvatan odgovor na monoterapiju.

#### 4.2 Doziranje i način primjene

##### *Odrasli muškarci, uključujući starije osobe*

Jedna Semquest tableta (6 mg/0,4 mg) jedanput na dan uzeta oralno, s hranom ili bez nje.

Maksimalna dnevna doza je jedna Semquest tableta (6 mg/0,4 mg).

Tableta se mora progutati cijela, u komadu bez griženja ili žvakanja. Tableta se ne smije drobiti.

##### *Bolesnici s oštećenjem bubrega*

Učinak oštećenja bubrega na farmakokinetiku lijeka solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid nije ispitivan. Međutim, dobro je poznat učinak na farmakokinetiku pojedinačnih djelatnih tvari (vidjeti dio 5.2). Solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid se može primjenjivati u bolesnika s blagim do umjerenim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina  $> 30 \text{ ml/min}$ ). Bolesnici s teškim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina  $\leq 30 \text{ ml/min}$ ) se moraju liječiti uz oprez, a maksimalna dnevna doza u tih bolesnika je jedna Semquest tableta (6 mg/0,4 mg) (vidjeti dio 4.4).

##### *Bolesnici s oštećenjem jetre*

Učinak oštećenja jetre funkcije na farmakokinetiku lijeka solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid nije ispitivan. Međutim, dobro je poznat učinak na farmakokinetiku pojedinačnih djelatnih tvari (vidjeti dio 5.2). Solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid se može primjenjivati u bolesnika s blagim oštećenjem jetre (Child-Pugh indeks  $\leq 7$ ). Bolesnike s umjerenim oštećenjem jetre funkcije (Child-Pugh indeks: 7-9) se mora liječiti uz oprez, a maksimalna dnevna doza u tih bolesnika je jedna Semquest tableta (6 mg/0,4 mg). Primjena lijeka Semquest u bolesnika s teškim oštećenjem jetre funkcije (Child-Pugh indeks  $> 9$ ) je kontraindicirana (vidjeti dio 4.3).

#### *Umjereni i snažni inhibitori citokroma P450 3A4*

Maksimalna dnevna doza lijeka Semquest se mora ograničiti na jednu tabletu (6 mg/0,4 mg). Solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid se mora primjenjivati uz oprez u bolesnika koji se istodobno liječe umjerenim ili snažnim inhibitorima CYP3A4, npr. verapamilom, ketokonazolom, ritonavirom, nelfinavirom, itrakonazolom (vidjeti dio 4.5).

#### *Pedijatrijska populacija*

Nema relevantne indikacije za primjenu lijeka solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid u djece i adolescenata.

#### **4.3 Kontraindikacije**

- Bolesnici s preosjetljivošću djelatne tvar(i) ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1
- Bolesnici na hemodializi (vidjeti dio 5.2)
- Bolesnici s teškim oštećenjem jetrene funkcije (vidjeti dio 5.2)
- Bolesnici s teškim oštećenjem bubrežne funkcije koji se liječe i snažnim inhibitorom citokroma P450 (CYP) 3A4, npr. ketokonazolom (vidjeti dio 4.5)
- Bolesnici s umjerenim oštećenjem jetre koji se liječe i snažnim inhibitorom CYP3A4, npr. ketokonazolom (vidjeti dio 4.5)
- Bolesnici s teškim bolestima probavnog sustava (uključujući toksični megakolon), miastenijom gravis ili glaukomom uskog kuta te bolesnici u kojih postoji rizik od tih bolesti
- Bolesnici s ortostatskom hipotenzijom u anamnezi

#### **4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi**

Solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid se mora primjenjivati uz oprez u bolesnika s:

- teškim oštećenjem bubrega
- rizikom od retencije mokraće
- opstruktivnim poremećajima probavnog sustava
- rizikom od usporenog motiliteta probavnog sustava
- hijatalnom hernijom/gastroezofagealnim refluksom i ili bolesnika koji istodobno uzimaju lijekove (poput bisfosfonata) koji mogu uzrokovati ili dovesti do egzacerbacije ezofagitisa
- autonomnom neuropatijom

Bolesnika se mora pregledati kako bi se isključila prisutnost drugih bolesti koje mogu uzrokovati simptome slične simptomima benigne hiperplazije prostate.

Prije početka liječenja lijekom solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid, u bolesnika se mora napraviti procjena drugih mogućih uzroka učestalog mokrenja (zatajenje srca ili bubrežna bolest). Ako bolesnik ima infekciju mokraćnih putova, mora se uvesti odgovarajuća antibiotika terapija.

U bolesnika liječenih solifenacinsukcinatom koji su imali faktore rizika poput postojećeg sindroma dugog QT-intervala i hipokalemije primijećeni su produljenje QT-intervala i *torsade de pointes*.

U nekih bolesnika liječenih solifenacinsukcinatom i tamsulozinom prijavljen je angioedem praćen opstrukcijom dišnih putova. Ako se pojavi angioedem, liječenje lijekom solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid mora se prekinuti i ne smije se ponovno započinjati. Potrebno je uvesti odgovarajuću terapiju i ili mjere.

U nekih bolesnika liječenih solifenacinsukcinatom prijavljena je anafilaktička reakcija. U bolesnika u kojih se razvije anafilaktička reakcija mora se prekinuti liječenje lijekom solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid te uvesti odgovarajuća terapija i ili mjere.

Kao i kod primjene drugih antagonista alfa-1-adrenoreceptora, tijekom liječenja tamsulozinom može u individualnim slučajevima doći do pada krvnog tlaka, što u rijetkim slučajevima za posljedicu može imati sinkopu. Bolesnike koji započinju liječenje lijekom solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid mora se uputiti da na prve znakove ortostatske hipotenzije (omaglica, slabost) sjednu ili legnu dok se simptomi ne povuku.

Intraoperacijski sindrom meke šarenice (IFIS, engl. *intraoperative floppy iris syndrome*, vrsta sindroma male

zjenice), primjećen je tijekom operacije katarakte i glaukoma u nekih bolesnika koji su se u trenutku operacije ili prije toga liječili tamsulozinklорidom. IFIS može povećati rizik od očnih komplikacija tijekom i nakon operacije. Stoga se ne preporučuje započinjati liječenje lijekom solifenacinsukcinat/tamsulozinklорid u bolesnika koji imaju dogovorenu operaciju katarakte ili glaukoma. Iako se smatra da bi moglo biti korisno prekinuti liječenje lijekom solifenacinsukcinat/tamsulozinklорid 1-2 tjedna prije operacije katarakte ili glaukoma, stvarna korist od prekida liječenja nije utvrđena. Tijekom preoperativne obrade, kirurzi i oftalmološki timovi moraju uzeti u obzir jesu li bolesnici kojima je dogovorena operacija katarakte ili glaukoma liječeni ili se liječe lijekom solifenacinsukcinat/tamsulozinklорid, kako bi mogli osigurati sve potrebne mjere za zbrinjavanje IFIS-a tijekom operacije.

Solifenacinsukcinat/tamsulozinklорid se mora primjenjivati uz oprez u kombinaciji s umjerenim i snažnim inhibitorima CYP3A4 (vidjeti dio 4.5), i ne smije se primjenjivati u kombinaciji sa snažnim inhibitorima CYP3A4, npr. ketokonazolom, u bolesnika koji su fenotipski spori metabolizatori CYP2D6 ili koji uzimaju snažne inhibitore CYP2D6, npr. paroksetin.

#### **4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija**

Istodobna primjena lijekova s antikolinergičkim djelovanjem može rezultirati izraženijim terapijskim učincima i nuspojavama. Prije početka bilo kakve antikolinergičke terapije treba napraviti razmak od otprilike tjedan dana nakon prestanka liječenja s lijekom solifenacinsukcinat/tamsulozinklорid. Terapijski učinak solifenacina može se smanjiti istodobnom primjenom agonista kolinergičkih receptora.

##### *Interakcije s inhibitorima CYP3A4 i CYP2D6*

Istodobna primjena solifenacina i ketokonazola (snažnog inhibitora CYP3A4) (200 mg na dan) rezultirala je povećanjem  $C_{max}$  solifenacina 1,4 puta, i područje ispod krivulje (AUC) povećano je 2,0 puta, dok je ketokonazol u dozi od 400 mg na dan povećao  $C_{max}$  solifenacina 1,5 puta, a AUC 2,8 puta.

Istodobna primjena tamsulozina i ketokonazola u dozi od 400 mg na dan rezultirala je povećanjem je  $C_{max}$  tamsulozina 2,2 puta, odnosno AUC 2,8 puta.

Budući da istodobna primjena sa snažnim inhibitorima CYP3A4, poput ketokonazola, ritonavira, nelfinavira i itrakonazola, može povećati izloženost solifenacina i tamsulozinu, solifenacinsukcinat/tamsulozinklорid se mora primjenjivati uz oprez u kombinaciji sa snažnim inhibitorima CYP3A4.

Solifenacinsukcinat/tamsulozinklорid se ne smije primjenjivati zajedno sa snažnim inhibitorima CYP3A4 u bolesnika koji su fenotipski spori metabolizatori CYP2D6 ili koji već uzimaju snažne inhibitore CYP2D6.

Istodobna primjena lijeka solifenacinsukcinat/tamsulozinklорid s verapamilom (umjerenim inhibitorom CYP3A4) rezultirala je povećanjem  $C_{max}$  i AUC tamsulozina približno 2,2 puta, a  $C_{max}$  i AUC solifenacina približno 1,6 puta. Solifenacinsukcinat/tamsulozinklорid se mora primjenjivati uz oprez u kombinaciji s umjerenim inhibitorima CYP3A4.

Istodobna primjena tamsulozina s cimetidinom, slabim inhibitorom CYP3A4 (400 mg svakih 6 sati), rezultirala je povećanjem AUC tamsulozina 1,44 puta, dok se  $C_{max}$  nije značajno promijenio. Solifenacinsukcinat/tamsulozinklорid se može primjenjivati sa slabim inhibitorima CYP3A4.

Istodobna primjena tamsulozina sa snažnim inhibitorom CYP2D6 paroksetinom (20 mg na dan), rezultirala je povećanjem  $C_{max}$  tamsulozina 1,3 puta, odnosno AUC 1,6 puta. Solifenacinsukcinat/tamsulozinklорid se može primjenjivati s inhibitorima CYP2D6.

Učinak indukcije enzima na farmakokinetiku solifenacina i tamsulozina nije ispitivan. Budući da se solifenacin i tamsulozin metaboliziraju putem CYP3A4, moguće su farmakokinetičke interakcije s induktorima CYP3A4 (npr. rifampicinom), koje mogu smanjiti koncentraciju solifenacina i tamsulozina u

plazmi.

#### *Ostale interakcije*

Sljedeće tvrdnje odražavaju dostupne informacije o pojedinačnim djelatnim tvarima.

#### Solifenacin

- Solifenacin može umanjiti učinak lijekova koji stimuliraju motilitet probavnog sustava, poput metoklopramida i cisaprida.
- *In vitro* ispitivanja solifenacina pokazala su da solifenacin u terapijskim koncentracijama ne inhibira CYP1A1/2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ni 3A4. Stoga se ne očekuju interakcije između solifenacina i lijekova koje metaboliziraju navedeni CYP enzimi.
- Primjena solifenacina nije izmijenila farmakokinetiku *R*-varfarina ni *S*-varfarina niti njihov učinak na protrombinsko vrijeme.
- Primjena solifenacina nije utjecala na farmakokinetiku digoksina.

#### Tamsulozin

- Istodobna primjena s drugim antagonistima alfa1-adrenoreceptora može imati hipotenzivne učinke.
- Diazepam, propranolol, triklormetiazid, klormadinon, amitriptilin, diklofenak, glibenklamid, simvastatin i varfarin nisu izmijenili slobodnu frakciju tamsulozina u ljudskoj plazmi *in vitro*. Tamsulozin nije izmijenio slobodnu frakciju diazepama, propranolola, triklormetiazida ni klormadinona. Međutim, diklofenak i varfarin mogu povećati brzinu eliminacije tamsulozina.
- Istodobna primjena s furosemidom uzrokuje pad razine tamsulozina u plazmi, ali s obzirom da te razine ostaju unutar raspona normalnih vrijednosti, istodobna primjena je prihvatljiva.
- *In vitro* ispitivanja tamsulozina pokazala su da tamsulozin u terapijskim koncentracijama ne inhibira CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ni 3A4. Stoga se ne očekuju interakcije između tamsulozina i lijekova koje metaboliziraju navedeni CYP enzimi.
- Nisu primjećene interakcije kada se tamsulozin primjenjivao istodobno s atenololom, enalaprilom ili teofilinom.

### **4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje**

#### *Plodnost*

Nisu ispitivani učinci lijeka solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid na plodnost. Ispitivanja na životinjama provedena sa solifenacinom ili tamsulozinom ne ukazuju na štetne učinke na plodnost niti na rani embrionalni razvoj (vidjeti dio 5.3).

U kratkotrajnim i dugotrajnim kliničkim ispitivanjima tamsulozina primijećeni su poremećaji ejakulacije. U razdoblju nakon stavljanja lijeka u promet prijavljeni su slučajevi poremećaja ejakulacije, retrogradne ejakulacije i nemogućnosti ejakulacije.

#### *Trudnoća i dojenje*

Solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid nije indiciran za primjenu u žena.

### **4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima**

Nisu provedena ispitivanja o učincima lijeka solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Međutim, bolesnike je potrebno upozoriti na moguću pojavu omaglice, zamagljena vida, umora te manje često somnolencije, koje mogu negativno utjecati na sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima (vidjeti dio 4.8).

### **4.8 Nuspojave**

### Sažetak sigurnosnog profila

Solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid može uzrokovati antikolinergičke nuspojave, koje su općenito blage do umjerene težine. Najčešće prijavljene nuspojave tijekom kliničkih ispitivanja provedenih radi razvoja lijeka 6 mg solifenacinsukcinat/ 0,4 mg tamsulozinklorid bile su suha usta (9,5%), potom konstipacija (3,2%) i dispepsija (uključujući bol u abdomenu; 2,4%). Druge česte nuspojave su omaglica (uključujući vrtoglavicu; 1,4%), zamgljen vid (1,2%), umor (1,2%) i poremećaj ejakulacije (uključujući retrogradnu ejakulaciju; 1,5%). Akutna retencija mokraće (0,3%, manje česta nuspojava) je najozbiljnija nuspojava primijećena tijekom liječenja lijekom solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid u kliničkim ispitivanjem.

### Tablični prikaz nuspojava

U tablici ispod, stupac u kojem se navodi učestalost nuspojava kod primjene lijeka solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid odnosi se na nuspojave primijećene tijekom dvostrukog slijepih kliničkih ispitivanja provedenih radi razvoja lijeka solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid (na temelju nuspojava povezanih s liječenjem koje su prijavila najmanje dva bolesnika i koje su prijavljene s većom učestalošću nego kod primjene placeboa u dvostrukom slijepim ispitivanjima).

Stupci "učestalost nuspojava solifenacina" i "učestalost nuspojava tamsulozina" odražavaju nuspojave lijeka koje su prethodno prijavljene s jednom od pojedinačnih komponenti koje se također mogu javiti pri uzimanju lijeka solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid (neke od njih nisu primijećene tijekom programa kliničkog razvoja solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid).

Učestalost nuspojava definirana je kao: vrlo često ( $\geq 1/10$ ); često ( $\geq 1/100$  i  $< 1/10$ ); manje često ( $\geq 1/1000$  i  $< 1/100$ ); rijetko ( $\geq 1/10\ 000$  i  $< 1/10\ 000$ ); vrlo rijetko ( $< 1/10\ 000$ ), nepoznato (ne može se procijeniti na temelju dostupnih podataka).

Organski sustav/preferirani pojam	Učestalost nuspojava primijećena tijekom razvoja lijeka solifenacinsukcinat/ tamsulozinklorid	Učestalost nuspojava primijećena kod primjene pojedinačnih djelatnih tvari	
		solifenacin 5 mg i 10 mg <sup>#</sup>	tamsulozin 0,4 mg <sup>#</sup>
<b>Infekcije i infestacije</b>			
infekcija mokraćnih putova		manje često	
cistitis		manje često	
<b>Poremećaji imunološkog sustava</b>			
anafilaktička reakcija		nepoznato***	
<b>Poremećaji metabolizma i prehrane</b>			
smanjen apetit		nepoznato*	
hiperkalijemija		nepoznato*	
<b>Psihijatrijski poremećaji</b>			
halucinacije		vrlo rijetko*	
stanje konfuzije		vrlo rijetko*	
delirij		nepoznato*	
<b>Poremećaji živčanog sustava</b>			
omaglica	često	rijetko*	često
somnolencija		manje često	
disgeuzija		manje često	
glavobolja		rijetko*	Manje često
sinkopa			rijetko
<b>Poremećaji oka</b>			
zamgljen vid	često	često	nepoznato*

Intraoperacijski sindrom meke šarenice (IFIS)			nepoznato**
suhe oči		manje često	
glaukom		nepoznato*	
oštećenje vida			nepoznato*
<b>Srčani poremećaji</b>			
palpitacije		nepoznato*	manje često
<i>torsade de pointes</i>		nepoznato*	
produljenje QT-intervala na elektrokardiogramu		nepoznato*	
fibrilacija atrija		nepoznato*	nepoznato*
aritmija			nepoznato*
tahikardija		nepoznato*	nepoznato*
<b>Krvožilni poremećaji</b>			
ortostatska hipotenzija			manje često
<b>Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja</b>			
rinitis			manje često
suhoca nosa		manje često	
dispneja			nepoznato*
disfonija		nepoznato*	
epistaksa			nepoznato*
<b>Poremećaji probavnog sustava</b>			
suha usta	često	vrlo često	
dispepsija	često	često	
konstipacija	često	često	manje često
mučnina		često	manje često
bolovi u abdomenu		često	
gastroezofagealna refluksna bolest		manje često	
proljev			manje često
suho grlo		manje često	
povraćanje		rijetko*	Manje često
opstrukcija kolona		rijetko	
fekalna impakcija		rijetko	
ileus		nepoznato*	
nelagoda u abdomenu		nepoznato*	
<b>Poremećaji jetre i žuči</b>			
jetreni poremećaj		nepoznato*	
abnormalni testovi jetrene funkcije		nepoznato*	
<b>Poremećaji kože i potkožnog tkiva</b>			
pruritus	manje često	rijetko*	manje često
suha koža		manje često	
osip		rijetko*	manje često
urtikarija		vrlo rijetko*	manje često
angioedem		vrlo rijetko*	rijetko
Stevens-Johnsonov sindrom			vrlo rijetko*
multiformni eritem		vrlo rijetko*	nepoznato*
eksfolijativni		nepoznato	nepoznato*
<b>Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva</b>			
mišićna slabost		nepoznato*	

<b>Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava</b>			
retencija mokraće***	manje često	rijetko	
otežano mokrenje		manje često	
oštećenje bubrežne funkcije		nepoznato*	
<b>Poremećaji reproduktivnog sustava i dojki</b>			
poremećaji ejakulacije, uključujući retrogradnu ejakulaciju nemogućnost ejakulacije	često		često
prijapizam			vrlo rijetko
<b>Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene</b>			
umor	često	manje često	
periferni edem		manje često	
astenija			manje često

<sup>#</sup>: nuspojave primjećene kod primjene solifenacina i tamsulozina uključene u ovu tablicu su nuspojave navedene u sažecima opisa svojstava oba lijeka

<sup>\*</sup>: nuspojave prijavljene nakon stavljanja lijeka u promet. Budući da su spontane prijave prikupljene diljem svijeta tijekom postmarketinškog iskustva, učestalost događaja i uloga solifenacina ili tamsulozina te njihova uzročna povezanost s nuspojavama ne mogu se pouzdano utvrditi

<sup>\*\*</sup>: nuspojave prijavljene nakon stavljanja lijeka u promet primjećene tijekom operacije katarakte i glaukoma

<sup>\*\*\*</sup>: vidjeti dio 4.4

#### *Dugoročna sigurnost lijeka solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid*

Profil nuspojava primjećen tijekom liječenja u trajanju do 1 godine bio je sličan onom primjećenom u 12-tjednim ispitivanjima. Kombinacija solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid se dobro podnosi i nema posebnih nuspojava koje se povezuju s dugotrajnom primjenom lijeka.

#### *Opis odabranih nuspojava*

Za retenciju mokraće vidjeti dio 4.4.

#### *Starije osobe*

Solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid je indiciran za liječenje umjerenih do teških simptoma zadržavanja mokraće (neodgovara potreba za mokrenjem, povećana učestalost mokrenja) i simptoma pražnjenja mokraćnog mjehura udruženih s BHP-om, a to je bolest koja pogoda starje muškarce. Klinički razvoj lijeka solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid proveden je s bolesnicima u dobi od 45 do 91 godine, uz prosječnu dob od 65 godina. Nuspojave u starijoj skupini bolesnika bile su slične onima primjećenima u mlađoj skupini bolesnika.

#### *Prijavljivanje sumnji na nuspojavu*

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u

[Dodatu V](#).

## 4.9 Predoziranje

#### *Simptomi*

Predoziranje kombinacijom solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid može potencijalno izazvati teške

antikolinergičke učinke uz akutnu hipotenziju. Najveća doza primijenjena slučajno tijekom kliničkog ispitivanja iznosila je 126 mg solifenacinsukcinata i 5,6 mg tamsulozinklorida. Ta se doza dobro podnosi te je jedina prijavljena nuspojava bila suhoća usta tijekom 16 dana.

#### *Liječenje*

U slučaju predoziranja solifenacinom i tamsulozinom, bolesnika se mora liječiti aktivnim ugljenom. Ispiranje želuca je korisno ako se provede unutar 1 sata nakon predoziranja, ali ne smije se inducirati povraćanje.

Kao i kod drugih antikolinergika, simptomi predoziranja koje uzrokuje solifenacin mogu se liječiti na sljedeći način:

- teški antikolinergički učinci na središnji živčani sustav, poput halucinacija ili izraženog uzbudjenja: liječiti fizostigminom ili karbakolom
- konvulzije ili izraženo uzbudjenje: liječiti benzodiazepinima
- insuficijencija dišnog sustava: upotrijebiti respirator
- tahikardija: po potrebi liječiti simptomatski. Beta-blokatore se mora primjenjivati uz oprez jer istodobno predoziranje tamsulozinom može inducirati tešku hipotenziju.
- retencija mokraće: liječiti kateterizacijom

Kao i kod drugih antimuskarinika, u slučaju predoziranja posebnu pozornost mora se posvetiti bolesnicima s poznatim rizikom od produljenja QT-intervala (npr. hipokalijemijom, bradikardijom i istodobnom primjenom lijekova za koje je poznato da produljuju QT-interval) i relevantnim postojećim srčanim bolestima (npr. ishemijom miokarda, aritmijom, kongestivnim zatajenjem srca).

Akutnu hipotenziju, koja se nakon predoziranja može javiti zbog djelovanja tamsulozina, mora se liječiti simptomatski. Dijaliza vjerojatno neće pomoći jer se tamsulozin u velikoj mjeri veže za proteine u plazmi.

## **5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA**

### **5.1 Farmakodinamička svojstva**

Farmakoterpijska skupina: antagonisti alfa-adrenoreceptora ATK oznaka: G04CA53

#### *Mehanizam djelovanja*

Solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid je tableta koja sadrži fiksnu kombinaciju dviju djelatnih tvari, solifenacina i tamsulozina. Te djelatne tvari imaju neovisne i komplementarne mehanizme djelovanja u liječenju simptoma donjih mokraćnih putova (LUTS) povezanih s BHP-om i praćenih simptomima zadržavanja mokraće.

Solifenacin je kompetitivan i selektivan antagonist muskarinskih receptora koji ne pokazuje značajan afinitet za brojne druge ispitivane receptore, enzime i ionske kanale. Solifenacin pokazuje najveći afinitet za muskarinske M3-receptore te muskarinske M1- i M2-receptore.

Tamsulozin je antagonist alfa1-adrenoreceptora. Veže se selektivno i kompetitivno za postsinaptičke alfa-1-adrenoreceptore, osobito za podtipove alfa-1A i alfa-1D, te djeluje kao potentan antagonist u tkivima donjih mokraćnih putova.

#### *Farmakodinamički učinci*

Semquest tablete sastoje se od dviju djelatnih tvari koje neovisno i komplementarno djeluju na simptome donjih mokraćnih putova povezane s BHP-om i praćene simptomima zadržavanja mokraće:

- Solifenacin ublažava tegobe povezane s funkcijom zadržavanja mokraće uzrokovane acetilkolinom koji se ne otpušta iz živčanih završetaka, a aktivira M3-receptore u mokraćnom mjehuru. Acetilkolin koji se ne otpušta iz živčanih završetaka pojačava osjetljivost osjetilne funkcije uroepitela, što se manifestira kao neodgodiva potreba za mokrenjem i učestalije mokrenje.

- Tamsulozin ublažava simptome pražnjenja mokraćnog mjehura (povećava maksimalnu brzinu protoka mokraće) tako što smanjuje opstrukciju opuštanjem glatkih mišića prostate, vrata mokraćnog mjehura i uretre. Ublažava i simptome zadržavanja mokraće.

#### *Klinička djelotvornost i sigurnost*

Djelotvornost je dokazana u pivotalnom ispitivanju faze 3, provedenom u bolesnika sa simptomima donjih mokraćnih putova povezanim s BHP-om i praćenima simptomima pražnjenja mokraćnog mjehura (opstrukcije) te najmanje sljedećim stupnjem simptoma zadržavanja mokraće (nadraženosti):  $\geq 8$  mokrenja/24 sata i  $\geq 2$  epizode neodgodive potrebe za mokrenjem/24 sata.

Solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid je od početka do kraja ispitivanja doveo do statistički značajnih poboljšanja u usporedbi s placebom s obzirom na dvije primarne mjere ishoda - ukupan rezultat prema Međunarodnom indeksu simptoma prostate (engl. *International Prostate Symptom Score*, IPSS) i ukupan rezultat za neodgodivu potrebu za mokrenjem i učestalost mokrenja - te s obzirom na sekundarne mjere ishoda: neodgodivu potrebu za mokrenjem, učestalost mokrenja, srednji izmokreni volumen po mokrenju, nokturniju, podrezultat za pražnjenje mokraćnog mjehura prema IPSS indeksu, rezultat za razinu smetnji koje uzrokuju simptomi ('bother score') u upitniku za ocjenu prekomjerno aktivnog mokraćnog mjehura (engl. *Overactive Bladder questionnaire*, OAB-q) te rezultat za kvalitetu života vezanu uz zdravlje prema OAB-q upitniku, uključujući sve podrezultate (nošenje s bolešću, zabrinutost, spavanje i društvene aktivnosti).

Solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid se pokazao superiornim tamsulozinu u obliku s produljenim oslobađanjem (tamsoluzin OCAS engl. *oral controlled absorption system*) s obzirom na poboljšanje ukupnog rezultata za neodgodivu potrebu za mokrenjem i učestalost mokrenja te na poboljšanje učestalosti mokrenja, srednjeg izmokrenog volumena po mokrenju i podrezultata za zadržavanje mokraće prema IPSS indeksu. To je bilo praćeno značajnim poboljšanjima rezultata za kvalitetu života prema IPSS indeksu i ukupnog rezultata za kvalitetu života vezanu uz zdravlje prema OAB-q upitniku, uključujući sve podrezultate.

Nadalje, solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid je bio neinferioran u odnosu na tamsulozin u obliku s produljenim oslobađanjem s obzirom na ukupan rezultat prema IPSS indeksu ( $p < 0,001$ ), što je bilo i očekivano.

## **5.2 Farmakokinetička svojstva**

### Solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid

Informacije u nastavku odnose se na farmakokinetičke parametre nakon primjene višekratnih doza lijeka solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid.

Ispitivanje relativne bioraspoloživosti nakon višekratnih doza pokazalo je da primjena lijeka solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid dovodi do izloženosti usporedive s onom koja se postiže kod istodobne primjene zasebnih solifenacin tableta i tamsulozin tableta s produljenim oslobađanjem u istoj dozi.

### *Apsorpcija*

Nakon višekratnih doza lijeka solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid,  $t_{max}$  solifenacina se u različitim ispitivanjima kretao u rasponu od 4,27 sati do 4,76 sati, a  $t_{max}$  tamsulozina u rasponu od 3,47 sati do 5,65 sati. Odgovarajuće vrijednosti  $C_{max}$  solifenacina kretale su se u rasponu od 26,5 ng/ml do 32,0 ng/ml, dok se  $C_{max}$  tamsulozina kretao u rasponu od 6,56 ng/ml do 13,3 ng/ml. Vrijednosti AUC-a solifenacina kretale su se između 528 ng.h/ml i 601 ng.h/ml, a tamsulozina između 97,1 ng.h/ml i 222 ng.h/ml. Apsolutna bioraspoloživost solifenacina iznosila je približno 90%, dok se apsorpcija tamsulozina procjenjuje na 70-79%.

Provedeno je ispitivanje učinka hrane na jednokratnu dozu lijeka, u kojem je solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid primjenjivan natašte, nakon doručka s niskim udjelom masti i niskom kalorijskom vrijednošću te nakon doručka s visokim udjelom masti i visokom kalorijskom vrijednošću. Nakon doručka s

visokim udjelom masti i visokom kalorijskom vrijednošću primijećeno je da se  $C_{max}$  tamsulozina u lijeku solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid povećao za 54% u usporedbi s primjenom lijeka natašte, dok se AUC povećao za 33%. Doručak s niskim udjelom masti i niskom kalorijskom vrijednošću nije utjecao na farmakokinetiku tamsulozina. Na farmakokinetiku solifenacina nisu utjecali ni doručak s niskim udjelom masti i niskom kalorijskom vrijednošću ni doručak s visokim udjelom masti i visokom kalorijskom vrijednošću.

Istodobna primjena solifenacina i tamsulozina u obliku s produljenim oslobađanjem povećala je  $C_{max}$  tamsulozina 1,19 puta, a AUC 1,24 puta u usporedbi s AUC-om postignutim nakon primjene samo tamsulozin tableta s produljenim oslobađanjem. Nije bilo pokazatelja koji bi ukazivali na to da tamsulozin utječe na farmakokinetiku solifenacina.

#### *Eliminacija*

Nakon jednokratne primjene lijeka solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid,  $t_{1/2}$  solifenacina kretao se u rasponu od 49,5 sati do 53,0 sati, a  $t_{1/2}$  tamsulozina u rasponu od 12,8 sati do 14,0 sati.

Višekratne doze verapamila od 240 mg jedanput na dan u kombinaciji s lijekom solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid povećale su  $C_{max}$  solifenacina za 60%, a AUC za 63%, dok se  $C_{max}$  tamsulozina povećao za 115%, a AUC za 122%. Promjene  $C_{max}$  i AUC-a ne smatraju se klinički značajnjima.

Populacijska farmakokinetička analiza podataka iz ispitivanja faze 3 pokazala je da intraindividualna varijabilnost farmakokinetike tamsulozina ovisi o razlikama u dobi, visini i koncentracijama  $\alpha 1$ -kiselog glikoproteina u plazmi. Starija dob i povećana koncentracija  $\alpha 1$ -kiselog glikoproteina bile su povezane s povećanjem AUC-a, dok je veća tjelesna visina bila povezana sa smanjenjem AUC-a. Isti su faktori doveli do sličnih promjena u farmakokinetici solifenacina. Osim toga, povećane razine gama-glutamil transpeptidaze bile su povezane s većim vrijednostima AUC-a. Te se promjene AUC-a ne smatraju klinički značajnjima.

Informacije o pojedinačnim djelatnim tvarima kada su se primjenjivale kao zasebni lijekovi nadopunjaju farmakokinetička svojstva lijeka solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid.

#### Solifenacin

##### *Apsorpcija*

Kod primjene solifenacin tableta,  $t_{max}$  je neovisan o dozi, a postiže se 3-8 sati nakon primjene višekratnih doza.  $C_{max}$  i AUC se povećavaju proporcionalno dozi između 5 mg i 40 mg. Apsolutna bioraspoloživost iznosi približno 90%.

##### *Distribucija*

Prividni volumen distribucije solifenacina nakon intravenske primjene iznosi približno 600 L. Približno 98% solifenacina veže se za proteine u plazmi, prvenstveno za  $\alpha 1$ -kiseli glikoprotein.

##### *Biotransformacija*

Budući da se sporo metabolizira, solifenacin ima slabo izražen učinak prvog prolaza. Solifenacin se u velikoj mjeri metabolizira u jetri, prvenstveno putem CYP3A4. Međutim, postoje i drugi metabolički putovi koji mogu pridonijeti metabolizmu solifenacina. Sistemski klirens solifenacina iznosi približno 9,5 l/h. Nakon peroralne primjene u plazmi su, uz solifenacin, pronađeni i jedan farmakološki aktivran (*4R*-hidroksi-solifenacin) te tri neaktivna metabolita (*N*-glukuronid, *N*-oksid i *4R*-hidroksil-*N*-oksid solifenacina).

#### *Eliminacija*

Nakon jednokratne primjene 10 mg [ $^{14}C$ -označenog]-solifenacina, tijekom 26 dana je približno 70% radioaktivnosti pronađeno u mokraći, a 23% u fecesu. U mokraći je približno 11% radioaktivnosti pronađeno u obliku neizmijenjene djelatne tvari, približno 18% u obliku *N*-oksid metabolita, 9% u obliku *4R*-hidroksil-*N*-oksid metabolita i 8% u obliku *4R* hidroksi metabolita (aktivni metabolit).

#### Tamsulozin

### *Apsorpcija*

Nakon primjene tamsulozina u obliku s produljenim oslobođanjem,  $t_{max}$  se postiže 4-6 sati nakon primjene višekratnih doza od 0,4 mg na dan.  $C_{max}$  i AUC se povećavaju proporcionalno dozi između 0,4 i 1,2 mg. Apsolutna bioraspoloživost procjenjuje se na približno 57%.

### *Distribucija*

Volumen distribucije tamsulozina nakon intravenske primjene iznosi približno 16 l. Približno 99% tamsulozina veže se za proteine u plazmi, prvenstveno za  $\alpha 1$ -kiseli glikoprotein.

### *Biotransformacija*

Budući da se sporo metabolizira, tamsulozin ima slabo izražen učinak prvog prolaza. Tamsulozin se u velikoj mjeri metabolizira u jetri, prvenstveno putem CYP3A4 i CYP2D6. Sistemski klirens tamsulozina iznosi približno 2,9 l/h. Većina tamsulozina nalazi se u plazmi u obliku neizmijenjene djelatne tvari. Nijedan od metabolita nije bio aktivniji od osnovnog spoja.

### *Eliminacija*

Nakon jednokratne doze od 0,2 mg [ $^{14}\text{C}$ -označenog]-tamsulozina, nakon tjedan dana je približno 76% radioaktivnosti izlučeno u mokraću, a 21% u feces. U mokraći je približno 9% radioaktivnosti pronađeno u obliku neizmijenjenog tamsulozina, približno 16% u obliku sulfata O-deetiliranog tamsulozina i 8% u obliku o-etoksifenoksi octene kiseline.

## **Značajke u posebnim skupinama bolesnika**

### *Starje osobe*

U kliničkim farmakološkim i biofarmaceutskim ispitivanjima, dob ispitanika bila je između 19 i 79 godina. Nakon primjene lijeka solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid najveće srednje vrijednosti izloženosti izmjerene su u starijih osoba, iako su se gotovo u potpunosti podudarale s pojedinačnim vrijednostima izmjerenima u mlađih ispitanika. To je potvrđeno populacijskom farmakokinetičkom analizom podataka iz ispitivanja faze 2 i 3. Solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid se može primjenjivati u starijih bolesnika.

### *Oštećenje bubrežne funkcije*

#### Solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid

Solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid se može primjenjivati u bolesnika s blagim do umjerenim oštećenjem bubrežne funkcije, ali ga je potrebno primjenjivati uz oprez u bolesnika s teškim oštećenjem bubrežne funkcije.

Farmakokinetika lijeka solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid nije ispitivana u bolesnika s oštećenjem bubrežne funkcije.

Sljedeće tvrdnje odražavaju dostupne informacije o pojedinačnim djelatnim tvarima koje se odnose na oštećenje bubrežne funkcije.

#### Solifenacin

AUC i  $C_{max}$  solifenacina u bolesnika s blagim ili umjerenim oštećenjem bubrežne funkcije nisu se značajno razlikovali od onih primijećenih u zdravih dobrovoljaca. U bolesnika s teškim oštećenjem bubrežne funkcije (klirens kreatinina  $\leq 30 \text{ ml/min}$ ) izloženost solifenacina bila je značajno veća od izloženosti u kontrolnim skupinama, uz povećanje  $C_{max}$  za približno 30%, AUC-a za više od 100% i  $t_{1/2}$  za više od 60%. Primijećena je statistički značajna povezanost između klirensa kreatinina i klirensa solifenacina.

Nije ispitivana farmakokinetika u bolesnika na hemodijalizi.

#### Tamsulozin

Uspoređena je farmakokinetika tamsulozina u 6 ispitanika s blagim do umjerenim ( $30 \leq \text{CrCl} < 70 \text{ ml/min}/1,73 \text{ m}^2$ ) ili teškim ( $< 30 \text{ ml/min}/1,73 \text{ m}^2$ ) oštećenjem bubrežne funkcije i 6 zdravih ispitanika ( $\text{CrCl} > 90 \text{ ml/min}/1,73 \text{ m}^2$ ). Iako je primijećena promjena ukupne koncentracije tamsulozina u plazmi kao posljedica izmijenjenog vezanja za  $\alpha 1$ -kiseli glikoprotein, koncentracija nevezanog (aktivnog) tamsulozinklorida i intrinzični klirens ostali su relativno nepromijenjeni.

Bolesnici u završnom stadiju bubrežne bolesti ( $\text{CrCl} < 10 \text{ ml/min}/1,73 \text{ m}^2$ ) nisu ispitivani.

#### *Oštećenje jetrene funkcije*

##### Solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid

Solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid se može primjenjivati u bolesnika s blagim do umjerenim oštećenjem jetrene funkcije, ali je kontraindiciran u bolesnika s teškim oštećenjem jetrene funkcije.

Farmakokinetika lijeka solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid nije ispitivana u bolesnika s oštećenjem jetrene funkcije. Sljedeće tvrdnje odražavaju dostupne informacije o pojedinačnim djelatnim tvarima koje se odnose na oštećenje jetrene funkcije.

##### Solifenacin

U bolesnika s umjerenim oštećenjem jetrene funkcije (Child-Pugh indeks: 7-9)  $C_{\max}$  se nije promijenio, AUC se povećao za 60%, a  $t_{1/2}$  se udvostručio. Nije ispitivana farmakokinetika solifenacina u bolesnika s teškim oštećenjem jetrene funkcije.

##### Tamsulozin

Uspoređena je farmakokinetika tamsulozina u 8 ispitanika s umjerenim oštećenjem jetrene funkcije (Child-Pugh indeks: 7-9) i 8 zdravih ispitanika. Iako je primijećena promjena ukupne koncentracije tamsulozina u plazmi kao posljedica izmijenjenog vezanja za  $\alpha 1$ -kiseli glikoprotein, koncentracija nevezanog (aktivnog) tamsulozina nije se značajno promijenila, a promjena intrinzičnog klirensa nevezanog tamsulozina bila je skromna (32%). Tamsulozin nije ispitivan u bolesnika s teškim oštećenjem jetrene funkcije.

### **5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene**

Nisu provedena neklinička ispitivanja lijeka solifenacinsukcinat/tamsulozinklorid. Solifenacin i tamsulozin su svaki pojedinačno detaljno ispitani u ispitivanjima toksičnosti na životinjama, a nalazi su bili u skladu s poznatom farmakološkom aktivnošću. Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, plodnosti, embriofetalnog razvoja, genotoksičnosti i kancerogenog potencijala te ne daju povoda za zabrinutost zbog mogućeg pojačanja ili sinergije nuspojava kod istodobne primjene solifenacina i tamsulozina.

## **6. FARMACEUTSKI PODACI**

### **6.1 Popis pomoćnih tvari**

#### Sloj tamsulozina – sloj s modificiranim otpuštanjem

Celuloza, mikrokristalična

Makrogol, visoke molekulske mase

Makrogol

Silicijev dioksid, koloidni, bezvodni

Magnezijev stearat

#### Sloj solifenacina - sloj s trenutnim otpuštanjem

Kalcijev hidrogenfosfat

Silicificirana mikrokristalična celuloza

Hidroksipropilceluloza, djelomično supstituirana

Magnezijev stearat

#### Film ovojnica

Hipromeloza

Makrogol

Željezov oksid, crveni (E172)

## **6.2 Inkompatibilnosti**

Nije primjenjivo.

## **6.3 Rok valjanosti**

27 mjeseci

## **6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka**

Lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

## **6.5 Vrsta i sadržaj spremnika**

PA/Aluminij/PVC/Aluminij blister u vanjskom pakiranju koji sadrži 10, 20, 30, 50, 60, 90 ili 100 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

## **6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje**

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

## **7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET**

Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irska

## **8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET**

HR-H-189973461

## **9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA**

Datum prvog odobrenja: 27. srpnja 2022.

## **10. DATUM REVIZIJE TEKSTA**

/-

