

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA

1. NAZIV LIJEKA

Vankomicin AptaPharma 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju
Vankomicin AptaPharma 1000 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Vankomicin AptaPharma 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju
Jedna boćica sadrži 500 mg vankomicinklorida što odgovara 500 000 IU vankomicina. Nakon rekonstitucije s 10 ml vode za injekciju, koncentrat za otopinu sadrži 50 mg/ml vankomicina.

Vankomicin AptaPharma 1000 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju
Jedna boćica sadrži 1000 mg vankomicinklorida što odgovara 1 000 000 IU vankomicina. Nakon rekonstitucije s 20 ml vode za injekciju, koncentrat za otopinu sadrži 50 mg/ml vankomicina.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak za koncentrat za otopinu za infuziju.
Bijeli do gotovo bijeli ili ružičasti sterilni liofilizirani porozni kolačić.

4. KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije

Intravenska primjena

Vankomicin je indiciran u svim dobnim skupinama za liječenje sljedećih infekcija (vidjeti dijelove 4.2, 4.4 i 5.1):

- komplikirane infekcije kože i mekih tkiva
- infekcija kostiju i zglobova
- izvanbolnički stečena pneumonija
- bolnički stečena pneumonija, uključujući pneumoniju povezanu s respiratorom
- infektivni endokarditis.

Vankomicin je također indiciran u svim dobnim skupinama za perioperativnu antibakterijsku profilaksu u bolesnika s visokim rizikom od razvoja bakterijskog endokarditisa kod velikih kirurških zahvata.

Peroralna primjena

Vankomicin je indiciran u svim dobnim skupinama za liječenje infekcije s *Clostridium difficile* (vidjeti dijelove 4.2, 4.4 i 5.1).

Potrebno je uzeti u obzir službene smjernice vezane uz primjerenu uporabu antibakterijskih lijekova.

4.2 Doziranje i način primjene

Doziranje

Kada je prikladno, vankomicin treba primjenjivati u kombinaciji s drugim antibakterijskim lijekovima.

Intravenska primjena

Početnu dozu je potrebno temeljiti na ukupnoj tjelesnoj težini. Daljnje prilagodbe doze je potrebno temeljiti na koncentracijama u serumu kako bi se postigle ciljane terapijske koncentracije. Potrebno je uzeti u obzir funkciju bubrega za daljnje doze i interval primjene.

Bolesnici u dobi od 12 godina i stariji

Preporučena doza iznosi 15 do 20 mg/kg tjelesne težine svakih 8 do 12 sati (ne smije prijeći 2 g po dozi).

U ozbiljno oboljelih bolesnika može se upotrijebiti udarna doza od 25-30 mg/kg tjelesne težine kako bi se olakšalo brzo postizanje ciljane koncentracije vankomicina u serumu.

Dojenčad i djeca u dobi od jednog mjeseca do 12 godina:

Preporučena doza je 10 do 15 mg/kg tjelesne težine svakih 6 sati (vidjeti dio 4.4).

Novorođenčad rođena u terminu (od rođenja do 27 dana postnatalne dobi) i nedonoščad (od rođenja do očekivanog datuma rođenja plus 27 dana)

Za utvrđivanje režima doziranja u novorođenčadi, potrebno je potražiti savjet liječnika koji ima iskustva u liječenju novorođenčadi. Jedan od mogućih načina doziranja vankomicina u novorođenčadi je prikazan u sljedećoj tablici: (vidjeti dio 4.4)

PMD (tjedni)	Doza (mg/kg)	Interval primjene (h)
< 29	15	24
29-35	15	12
> 35	15	8

PMD: postmenstrualna dob [(vrijeme između prvog dana posljednje menstruacije i porođaja (gestacijska dob) plus vrijeme proteklo od porođaja (postnatalna dob)].

Perioperativna profilaksa bakterijskog endokarditisa u svim dobnim skupinama.

Preporučena doza je početna doza od 15 mg/kg prije indukcije anestezije. Ovisno o trajanju kirurškog zahvata može biti potrebna druga doza vankomicina.

Trajanje liječenja

Predloženo trajanje liječenja prikazano je u sljedećoj tablici. U svakom slučaju, trajanje liječenja je potrebno prilagoditi vrsti i težini infekcije i individualnom kliničkom odgovoru.

Indikacija	Trajanje liječenja
Komplicirane infekcije kože i mekog tkiva - ne-nekrotizirajuće - nekrotizirajuće	7 do 14 dana 4 do 6 tjedana*
Infekcije kostiju i zglobova	4 do 6 tjedana**
Izvanbolnički stečena pneumonija	7 do 14 dana
Bolnički stečena pneumonija, uključujući pneumoniju izazvanu respiratorom	7 do 14 dana
Infektivni endokarditis	4 do 6 tjedana***

* Nastavite sve dok daljnji debridman ne bude neophodan, dok se ne zabilježi kliničko poboljšanje u bolesnika i dok bolesnik ne bude afebrilan 48 do 72 sata

** U slučaju infekcija umjetnih zglobova treba razmotriti dulja razdoblja oralne supresivne

terapije odgovarajućim antibioticima.

*** Trajanje i potreba za kombiniranom terapijom temelje se na vrsti zaliska i organizmu

Posebne populacije

Starije osobe

Donja doza održavanja može biti potrebna zbog smanjenja funkcije bubrega povezane s dobi.

Bolesnici s oštećenjem funkcije bubrega

U odraslih i pedijatrijskih bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega potrebno je razmotriti početnu dozu prateći najniže koncentracije vankomicina u serumu, a ne slijediti raspored režima doziranja, osobito u bolesnika s teškim oštećenjem funkcije bubrega ili onih koji su podvrgnuti bubrežnoj nadomjesnoj terapiji (BNT) s obzirom na mnoge faktore koji mogu utjecati na razinu vankomicina u takvih bolesnika.

U bolesnika s blagim ili umjerenim zatajenjem bubrega, početna se doza ne smije smanjivati. U bolesnika s teškim zatajenjem bubrega poželjno je produljiti interval primjene, a ne primjenjivati niže dnevne doze.

Potrebno je odgovarajuće razmotriti istodobnu primjenu lijekova koji mogu smanjiti klirens vankomicina i/ili potencirati njegove nuspojave (vidjeti dio 4.4).

Vankomicin se slabo dijalizira intermitentnom hemodijalizom. Međutim, korištenje membrana s visokim protokom i kontinuirane bubrežne nadomjesne terapije (KBNT) povećava klirens vankomicina i općenito zahtijeva nadomjesno doziranje (obično nakon obavljene hemodijalize u slučaju intermitentne hemodijalize).

Odrasli

Prilagodba doze u odraslih bolesnika se može temeljiti na glomerularnoj filtraciji (eGFR) određenoj sljedećom formulom:

Muškarci: [težina (kg) x 140 – dob (godine)] / 72 x serumski kreatinin (mg/dl)

Žene: 0,85 x vrijednost izračunata gornjom formulom.

Uobičajena početna doza za odrasle bolesnike je 15 do 20 mg/kg i može se primjenjivati svaka 24 sata u bolesnika s klirensom kreatinina između 20 i 49 ml/min. U bolesnika s teškim oštećenjem funkcije bubrega (klirens kreatinina ispod 20 ml/min) ili onih na bubrežnoj nadomjesnoj terapiji odgovarajuće vrijeme i količina naknadnih doza u velikoj mjeri ovise o modalitetu BNT-a i moraju se temeljiti na najnižim serumskim koncentracijama vankomicina i na rezidualnoj funkciji bubrega (vidjeti dio 4.4). Ovisno o kliničkoj situaciji, potrebno je uzeti u obzir uskraćivanje sljedeće doze dok se čekaju rezultati razine vankomicina.

U kritičnih bolesnika s bubrežnom insuficijencijom, početna udarna doza (25 do 30 mg/kg) se ne smije smanjivati.

Pedijatrijska populacija

Prilagodba doze kod pedijatrijskih bolesnika u dobi od 1 i više godina može se temeljiti na glomerularnoj filtraciji (eGFR) određenoj revidiranom Schwartzovom formulom:

eGFR (mL/min/1,73 m²) = (visina cm x 0,413) / serumski kreatinin (mg/dl)

eGFR (mL/min/1,73 m²) = (visina cm x 36,2) / serumski kreatinin (μmol/L)

Za novorođenčad i dojenčad mlađu od jedne godine potrebno je potražiti stručni savjet, budući

da revidirana Schwartzova formula nije primjenjiva na njih.

U sljedećoj tablici prikazane su preporuke orijentacijskih doza za pedijatrijsku populaciju koje slijede iste principe kao kod odraslih bolesnika.

GFR (ml/min/1,73 m ²)	Intravenska doza	Učestalost
50-30	15 mg/kg	12-satna
29-10	15 mg/kg	24-satna
< 10	10-15 mg/kg	Prilagodba doziranja temeljeno na razini*
Intermitentna hemodializa		
Peritonealna dijaliza		
Kontinuirana bubrežna nadomjesna terapija	15 mg/kg	Prilagodba doziranja temeljeno na razini *

* Odgovarajuće vrijeme i količina dalnjih doza u velikoj mjeri ovise o modalitetu BNT-a i trebaju se temeljiti na razinama serumskog vankomicina dobivenima prije doziranja i rezidualnoj funkciji bubrega. Ovisno o kliničkoj situaciji, može se uzeti u obzir uskraćivanje sljedeće doze dok se čekaju rezultati razine vankomicina.

Bolesnici s oštećenjem funkcije jetre:

Nije potrebno prilagođavanje doze u bolesnika s insuficijencijom jetre.

Trudnoća

Za postizanje terapijskih koncentracija u serumu kod trudnica može biti potrebno znatno povećanje doza (vidjeti dio 4.6).

Pretili bolesnici

Kod pretilih bolesnika potrebno je prilagoditi početnu dozu individualno prema ukupnoj tjelesnoj težini kao kod bolesnika koji nisu pretili.

Peroralna primjena

Bolesnici u dobi od 12 godina i stariji

Liječenje infekcije s Clostridium difficile:

Preporučena doza vankomicina je 125 mg svakih 6 sati tijekom 10 dana za prve epizode ne-teške infekcije s *Clostridium difficile*. Ova doza se može povećati na 500 mg svakih 6 sati tijekom 10 dana u slučaju teške ili komplikirane bolesti. Najveća dnevna doza ne smije prelaziti 2 g.

U bolesnika s višestrukim recidivima može se uzeti u obzir liječenje trenutne epizode infekcije s *Clostridium difficile* vankomicinom, 125 mg četiri puta dnevno tijekom 10 dana nakon čega slijedi smanjenje doze, odnosno postupno smanjivanje do 125 mg dnevno ili pulsni režim, odnosno 125 – 500 mg/dan svaka 2 – 3 dana tijekom najmanje 3 tjedna.

Novorođenčad, dojenčad i djeca mlađa od 12 godina

Preporučena doza vankomicina je 10 mg/kg peroralno svakih 6 sati tijekom 10 dana. Najveća dnevna doza ne smije prelaziti 2 g.

Trajanje liječenja vankomicinom može biti potrebno prilagoditi kliničkom tijeku u pojedinih bolesnika. Kad god je to moguće, potrebno je prekinuti liječenje antibiotikom za kojeg se

sumnja da je prouzročio infekciju s *Clostridium difficile*. Potrebno je osigurati primjerenu nadoknadu tekućine i elektrolita.

Praćenje serumske koncentracije vankomicina

Učestalost terapijskog praćenja koncentracije lijeka (engl. *therapeutic drug monitoring*, TDM) je potrebno individualizirati na temelju kliničke situacije i odgovora na liječenje, u rasponu od dnevnog uzorkovanja koje može biti potrebno u nekih hemodinamski nestabilnih bolesnika do barem jednom u tjednu u stabilnih bolesnika koji pokazuju odgovor na liječenje. U bolesnika s normalnom funkcijom bubrega koncentraciju vankomicina u serumu je potrebno pratiti drugi dan liječenja, neposredno prije sljedeće doze.

U bolesnika na intermitentnoj hemodializi, razine vankomicina je obično potrebno postići prije početka epizode hemodialize.

Nakon peroralne primjene potrebno je pratiti serumske koncentracije vankomicina u bolesnika s upalnim crijevnim poremećajima (vidjeti dio 4.4).

Najniža (minimalna) terapijski razina vankomicina u krvi obično treba iznositi $10 - 20 \text{ mg/l}$, ovisno o mjestu infekcije i osjetljivosti patogena. Najniže vrijednosti od $15 - 20 \text{ mg/l}$ obično preporučuju klinički laboratoriji kako bi bolje pokrili osjetljivo-klasificirane patogene s MIK $\geq 1 \text{ mg/l}$ (vidjeti dijelove 4.4 i 5.1).

Metode temeljene na modelu mogu biti korisne u predviđanju individualno potrebnih doza kako bi se dostigao odgovarajući AUC. Pristup temeljen na modelu može se koristiti u izračunu personalizirane početne doze i za prilagodbe doza na temelju rezultata TDM-a (vidjeti dio 5.1).

Način primjene

Intravenska primjena

Intravenski se vankomicin obično primjenjuje kao intermitentna infuzija i preporuke za doziranje opisane u ovom dijelu za intravensku primjenu odgovaraju ovoj vrsti primjene.

Vankomicin će se primijeniti samo kao spora intravenska infuzija u trajanju od najmanje jednog sata ili najveće brzine od 10 mg/min (ono što je dulje) koja je dovoljno razrijeđena (najmanje 100 ml na 500 mg ili najmanje 200 ml na 1000 mg) (vidjeti dio 4.4).

Bolesnici čiji unos tekućine mora biti ograničen mogu također primiti otopinu od $500 \text{ mg}/50 \text{ ml}$ ili $1000 \text{ mg}/100 \text{ ml}$, premda se s tim većim koncentracijama može povećati rizik od pojave nuspojava povezanih s infuzijom.

Za informacije o pripremi otopine vidjeti dio 6.6.

Kontinuirana infuzija vankomicina se može uzeti u obzir, primjerice, u bolesnika s nestabilnim klirensom vankomicina.

Peroralna primjena

Može se koristiti sadržaj bočica za parenteralnu primjenu.

Svaka doza mora se rekonstituirati u 30 ml vode i dati bolesniku kroz usta, ili primijeniti putem nazogastrične cijevi (vidjeti dio 6.6).

4.3 Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Vankomicin se ne smije davati intramuskularno zbog rizika od nekroze na mjestu primjene.

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Reakcije preosjetljivosti

Moguće su ozbiljne reakcije preosjetljivosti koje ponekad mogu uzrokovati smrt (vidjeti dijelove 4.3 i 4.8). U slučaju reakcija preosjetljivosti, liječenje vankomicinom je potrebno odmah prekinuti i potrebno je poduzeti odgovarajuće hitne mjere.

U bolesnika koji primaju vankomicin tijekom duljeg razdoblja ili istodobno s drugim lijekovima koji mogu uzrokovati neutropenu ili agranulocitozu potrebno je redovito pratiti broj leukocita. Svi bolesnici koji primaju vankomicin trebaju periodično obavljati hematološke pretrage, analizu urina i ispitivanje funkcije jetre i bubrega.

Vankomicin je potrebno koristiti s oprezom u bolesnika s alergijskim reakcijama na teikoplanin jer se može pojaviti križna preosjetljivost, uključujući anafilaktički šok koji može uzrokovati smrt.

Spektar antibakterijske aktivnosti

Spektar antibakterijskog djelovanja vankomicina ograničen je na gram-pozitivne mikroorganizme. Vankomicin nije pogodan za korištenje kao samostalan lijek za liječenje nekih vrsta infekcija, osim ako je patogen već dokumentiran i zna se da je osjetljiv ili postoji izrazita sumnja na određeni patogen koji će biti pogodan za liječenje vankomicinom.

Kod racionalnog korištenja vankomicina potrebno je uzeti u obzir spektar bakterijskog djelovanja, sigurnosni profil i prikladnost standardne antibakterijske terapije za liječenje pojedinog bolesnika.

Ototoksičnost

Ototoksičnost, koja može biti prolazna ili trajna (vidjeti dio 4.8), je uočena u bolesnika s prethodnom gluhoćom koji su primili prekomjerne intravenske doze ili su istodobno liječeni drugim ototoksičnim lijekovima, kao što su aminoglikozidi. Vankomicin također treba izbjegavati u bolesnika s prethodnim gubitkom sluha. Tinnitus može prethoditi gluhoći. Iskustva s drugim antibioticima sugeriraju da gubitak sluha može biti progresivan unatoč prestanku liječenja. Kako bi se smanjio rizik od ototoksičnosti, potrebno je periodično ispitivati razinu vankomicina u krvi, a također se preporučuje periodično ispitivanje funkcije sluha.

Starije osobe su posebno podložne oštećenju funkcije sluha. Praćenje vestibularne i slušne funkcije u starijih osoba potrebno je provoditi tijekom i nakon liječenja. Potrebno je izbjegavati istodobno ili sekvencijalno korištenje drugih ototoksičnih tvari.

Reakcije na infuziju

Brza primjena bolusa (odnosno primjena kroz nekoliko minuta) može biti povezana s jakom hipotenzijom (uključujući šok i rijetko srčani zastoj), reakcije nalik histaminskim i makulopapularnim ili eritemskim osipima („sindrom crvenog čovjeka” ili „sindrom crvenog vrata”). Vankomicin je potrebno sporo primjeniti u venu u razrijeđenoj otopini (2,5 do 5,0 mg/ml) pri brzini koja ne prelazi 10 mg/min i u trajanju od najmanje 60 minuta kako bi se izbjegle reakcije povezane s brzom infuzijom. Zaustavljanje infuzije obično rezultira brzim prestankom ovih reakcija.

Učestalost reakcija na infuziju (hipotenzija, naleti crvenila, eritem, urtikarija i svrbež) se povećava s istodobnom primjenom anestetika (vidjeti dio 4.5). Ovo se može reducirati primjenom infuzije vankomicina tijekom najmanje 60 minuta, prije početka anestezije.

Teške kožne nuspojave (SCAR, engl. severe cutaneous adverse reactions)

Kod liječenja vankomicinom zabilježene su teške kožne nuspojave (SCAR) koje mogu biti opasne po život ili smrtonosne, kao što su: Stevens-Johnsonov sindrom (SJS), toksična epidermalna nekroliza (TEN), reakcija na lijek s eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS sindrom) te akutna generalizirana egzenematozna pustuloza (AGEP). Većina ovih reakcija pojavljuje se unutar par dana pa do osam tjedana nakon početka liječenja vankomicinom.

Za vrijeme liječenja bolesnici moraju biti savjetovani o znakovima i simptomima kožnih nuspojava i pažljivo praćeni. Ako se pojave znakovi i simptomi sumnjivi na ove nuspojave, odmah se mora prekinuti liječenje vankomicinom i razmotriti zamjensko liječenje. Ako je bolesnik tijekom primjene vankomicina razvio teške kožne nuspojave (SCAR), ne smije se nikada više ponovno liječiti vankomicinom.

Reakcije na mjestu primjene

Bol i tromboflebitis se mogu javiti kao povremeno teške reakcije u mnogih bolesnika koji primaju vankomicin intravenski. Učestalost i težina tromboflebitisa može se minimizirati sporom primjenom lijeka u obliku razrijeđene otopine (vidjeti dio 4.2) i redovitim mijenjanjem mesta primjene.

Učinkovitost i sigurnost vankomicina nije utvrđena za intratekalni, intralumbalni i intraventrikularni put primjene.

Parenteralna primjena

Nefrotoksičnost

Vankomicin je potrebno koristiti s oprezom u bolesnika s bubrežnom insuficijencijom, uključujući anuriju jer je mogućnost razvoja toksičnih učinaka puno veća u prisustvu dugotrajno visokih koncentracija u krvi. Rizik od toksičnosti povećava se s visokim koncentracijama u krvi ili produljenim liječenjem.

Redovito praćenje razine vankomicina u krvi je indicirano u terapiji visokim dozama i dugotrajanom primjenom, osobito u bolesnika s bubrežnom disfunkcijom ili oštećenjem funkcije sluha, kao i kod istodobne primjene nefrotoksičnih, odnosno ototoksičnih tvari (vidjeti dijelove 4.2 i 4.5).

Poremećaji oka

Vankomicin nije odobren za intrakameralnu ili intravitrealnu primjenu, uključujući profilaksu endoftalmitisa.

Hemoragijski okluzivni vaskulitis mrežnice (engl. *haemorrhagic occlusive retinal vasculitis*, HORV), uključujući trajni gubitak vida, primjećen je u pojedinačnim slučajevima nakon intrakameralne ili intravitrealne primjene vankomicina tijekom ili nakon operacije katarakte.

Pedijatrijska populacija

Trenutne preporuke intravenskog doziranja za pedijatrijsku populaciju, osobito za djecu ispod 12 godina starosti, mogu dovesti do subterapijske razine vankomicina kod značajnog broja djece. Međutim, sigurnost povećanog doziranja vankomicinom nije odgovarajuće utvrđena, stoga se doze veće od 60 mg/kg/dan ne mogu generalno preporučivati.

Vankomicin je potrebno koristiti s posebnim oprezom u nedonoščadi i male djece zbog nerazvijenosti njihovih bubrega i mogućeg povećanja serumske koncentracije vankomicina. Koncentracije vankomicina u krvi stoga treba pomno pratiti u ovakve djece. Istodobna primjena vankomicina i anestetika je povezana s eritemom i crvenilom nalik crvenilu uzrokovanim histaminom. Također, istodobna primjena s nefrotoksičnim agensima, kao što su aminoglikozidni antibiotici, NSAIL-i (npr. ibuprofen za zatvaranje ductusa arteriosusa) ili amfotericin B je povezana s povećanim rizikom od nefrotoksičnosti (vidjeti dio 4.5), stoga je potrebno učestalo praćenje serumske razine vankomicina i funkcije bubrega.

Primjena u starijih osoba

Prirodno smanjenje glomerularne filtracije s povećanjem starosne dobi može dovesti do povišenih koncentracija vankomicina u serumu ako doza nije prilagođena (vidjeti dio 4.2).

Interakcije s anesteticima

Miokardijalna depresija izazvana anestetikom se može pojačati uporabom vankomicina. Tijekom anestezije doze moraju biti dobro razrijeđene i moraju se davati sporo, uz praćenje rada srca. Promjene položaja je potrebno odgoditi sve dok infuzija nije gotova, nakon čega je moguća posturalna prilagodba (vidjeti dio 4.5).

Pseudomembranozni enterokolitis

U slučaju teške perzistentne dijareje potrebno je uzeti u obzir mogući nastanak po život opasnog pseudomembranoznog enterokolitisa (vidjeti dio 4.8). Antidijsarici se ne smiju primjenjivati.

Superinfekcije

Dugotrajno korištenje vankomicina može rezultirati prekomjernim rastom neosjetljivih mikroorganizama. Neophodno je pažljivo praćenje bolesnika. Ako dođe do superinfekcije tijekom terapije, potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere.

Peroralna primjena

Intravenska primjena vankomicina nije učinkovita u liječenju infekcije s *Clostridium difficile*. Vankomicin je za ovu indikaciju potrebno primijeniti kroz usta.

Testiranje kolonizacije *Clostridium difficile* ili toksina se ne preporučuje u djece mlađe od 1 godine zbog visoke stope asimptomatske kolonizacije, osim ako je prisutna teška dijareja u dojenčadi s faktorima rizika za stazu poput Hirschsprungove bolesti, operirane analne atrezije ili drugih teških poremećaja motiliteta. Potrebno je uvijek tražiti drugu etiologiju i dokazati enterokolitis povezan s *Clostridium difficile*.

Potencijal za sistemsку apsorpciju

Apsorpcija se može povećati u bolesnika s upalnim poremećajima crijevne sluznice ili s pseudomembranoznim kolitism uzrokovanim s *Clostridium difficile*. Ovi bolesnici mogu biti izloženi riziku od razvoja nuspojava, osobito ako istodobno imaju poremećaj funkcije bubrega. Što je veće oštećenje bubrega, to je veći rizik od razvoja nuspojava povezanih s parenteralnom primjenom vankomicina. Potrebno je provoditi praćenje serumskih koncentracija vankomicina u bolesnika s upalnim poremećajima crijevne sluznice.

Nefrotoksičnost

Potrebno je redovito pratiti funkciju bubrega tijekom liječenja bolesnika s podležećim oštećenjem funkcije bubrega ili bolesnika koji istodobno primaju terapiju aminoglikozidima ili drugim nefrotoksičnim lijekovima.

Ototoksičnost

Serijska ispitivanja funkcije sluha mogu biti korisna u minimizaciji rizika od ototoksičnosti u bolesnika s podležećim gubitkom sluha ili koji istodobno primaju terapiju ototoksičnim lijekovima kao što su aminoglikozidi.

Interakcije s antipropulzivima i inhibitorima protonske pumpe

Potrebno je izbjegavati antipropulzive i preispitati uporabu inhibitora protonske pumpe.

Razvoj rezistentnih bakterija

Peroralna primjena vankomicina povećava vjerojatnost nastanka populacije enterokoka rezistentnih na vankomicin u probavnom traktu. Kao posljedica toga preporučuje se racionalna uporaba peroralnog vankomicina.

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Istodobna primjena vankomicina i anestetika povezana je s eritemom, histaminu sličnim crvenilom uz osjećaj vrućine i anafilaktoidnim reakcijama (vidjeti dio 4.4).

Izvješća pokazuju da se učestalost događaja povezanih s infuzijom povećava s istodobnom primjenom anestetika. To se može smanjiti primjenom infuzije vankomicina u trajanju od 60 minuta prije uvođenja u anesteziju. Kada se primjenjuje tijekom anestezije, doze se moraju razrijediti na 5 mg/ml ili manje i primijeniti polako uz pažljivo praćenje rada srca. Potrebno je odgoditi promjene položaja tijela bolesnika do završetka infuzije da bi se omogućila posturalna prilagodba.

Ukoliko se vankomicin primjeni tijekom ili neposredno nakon operacije djelovanje (neuromuskularna blokada) mišićnih relaksanasa (kao što je sukcinilkolin) koji su bili istodobno primijenjeni, može se pojačati i produljiti.

Istodobna ili uzastopna, sustavna ili topikalna primjena drugih potencijalno ototoksičnih ili nefrotoksičnih lijekova kao što su amfotericin B, aminoglikozidi, bacitracin, polimiksin B, kolistin, viomicin, cisplatin, diuretici Henleove petlje, piperacilin/tazobaktam i NSAIL, može povećati toksičnost vankomicina i, ukoliko se moraju primjenjivati, potrebno je to činiti oprezno i uz prikladno praćenje (vidjeti dio 4.4) (primjenjivo za parenteralni oblik lijeka).

Oralna primjena: Potrebno je razmotriti prekid primjene inhibitora protonске pumpe i antipropulziva u skladu s lokalnim smjernicama za infekciju s *Clostridium Difficile*.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća:

Podaci primjene vankomicina u trudnica su nedostatni. Istraživanja reproduktivne toksičnosti u životinja nisu otkrila nikakav štetni učinak na plod (vidjeti dio 5.3). Međutim, vankomicin prolazi kroz placentu i određeni rizik od ototoksičnosti za plod i novorođenče, te također od nefrotoksičnosti se ne može isključiti (vidjeti dio 5.1). Zbog toga se vankomicin u trudnica smije koristiti samo ako je neophodan i nakon pažljive procjene rizika.

Dojenje:

Vankomicinklorid se izlučuje u majčino mlijeko. Potreban je oprez pri primjeni vankomicina u dojilja zbog mogućih nuspojava u dojenčeta (oštećenje mikroflore crijeva s proljevom, kolonizacija kvasnicama i moguća senzibilizacija). Ukoliko je primjena vankomicina u majke neophodna, mora se razmotriti prekid dojenja.

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Vankomicin nema ili ima zanemariv utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

4.8 Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najčešće nuspojave su flebitis, pseudoalergijske reakcije i naleti crvenila kože u gornjem dijelu tijela („sindrom crvenog vrata”), povezane s brzom primjenom vankomicina u venu.

Parenteralni farmaceutski oblici za peroralnu primjenu: Apsorpcija vankomicina iz probavnog trakta je zanemariva. Međutim, kod teških upala crijevne sluznice, osobito u kombinaciji s bubrežnom insuficijencijom, moguća je pojавa nuspojave koje se javljaju kod parenteralne primjene vankomicina.

Teške kožne nuspojave (SCAR), uključujući Stevens-Johnsonov sindrom (SJS), toksičnu

epidermalnu nekrolizu (TEN), reakciju na lijek s eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS) i akutnu generaliziranu egzantematoznu pustulozu (AGEP), zabilježene su prilikom liječenja vankomicinom (vidjeti dio 4.4).

Tablični popis nuspojava

Nuspojave su navedene po padajućoj ozbiljnosti unutar svake klasifikacije učestalosti.

Nuspojave navedene u nastavku prikazane su prema MedDRA klasifikaciji organskih sustava i učestalosti:

Vrlo često ($\geq 1/10$); često ($\geq 1/100$ i $<1/10$); manje često ($\geq 1/1000$ i $<1/100$); rijetko ($\geq 1/10\ 000$ i $<1/1000$); vrlo rijetko ($<1/10\ 000$), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Klasifikacija organskih sustava	
Učestalost	Nuspojava
Poremećaji krvi i limfnog sustava:	
Rijetko	Reverzibilna neutropenija ¹ , agranulocitoza, eozinofilija, trombocitopenija, pancitopenija.
Poremećaji imunološkog sustava:	
Rijetko	Reakcije preosjetljivosti, anafilaktičke reakcije ²
Poremećaji uha i labirinta:	
Manje često	Prolazni ili trajni gubitak sluha ⁴
Rijetko	Vrtoglavica, tinitus ³ , omaglica
Srčani poremećaji:	
Vrlo rijetko	Srčani zastoj
Krvožilni poremećaji:	
Često	Pad krvnog tlaka
Rijetko	Vaskulitis
Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja:	
Često	Dispneja, stridor
Poremećaji probavnog sustava:	
Rijetko	Mučnina
Vrlo rijetko	Pseudomembranozni enterokolitis
Nepoznato	Povraćanje, proljev
Poremećaji kože i potkožnog tkiva:	
Često	Naleti crvenila kože gornjeg dijela tijela („sindrom crvenog čovjeka”), egzantem i upala sluznice, svrbež, urtikarija
Vrlo rijetko	Eksfolijativni dermatitis, Stevens-Johnsonov sindrom, Linearna IgA bulozna dermatoza, Toksična epidermalna nekroliza (TEN)
Nepoznato	Eozinofilija i sistemske simptomi (DRESS sindrom), AGEP (Akutna generalizirana egzantematozna pustuloza)

Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava:	
Često	Bubrežna insuficijencija primarno manifestirana povećanim serumskim kreatininom i serumskom urejom
Rijetko	Intersticijski nefritis, akutno zatajenje bubrega
Nepoznato	Akutna tubularna nekroza
Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene:	
Često	Flebitis, crvenilo kože gornjeg dijela tijela i lica
Rijetko	Vrućica uzrokovana lijekom, drhtanje, bol i spazam prsnih i lednih mišića

Opis odabranih nuspojava

¹Reverzibilna neutropenija obično počinje jedan tjedan ili više nakon početka intravenske terapije ili nakon ukupne doze veće od 25 g.

²Tijekom ili neposredno nakon brze infuzije može doći do anafilaktičkih/anafilaktoidnih reakcija, uključujući zviždanje u plućima (pri disanju). Reakcije se smiruju nakon prestanka primjene, obično između 20 minuta i 2 sata. Vankomicin je potrebno primijeniti sporo infuzijom (vidjeti dijelove 4.2 i 4.4). Nakon intramuskularne injekcije može se pojaviti nekroza.

³Tinitus, koji može prethoditi početku gluhoće, potrebno je smatrati znakom za prekid liječenja.

⁴Ototoksičnost je prvenstveno prijavljena u bolesnika koji su primili veliku dozu vankomicina ili su se istodobno liječili drugim ototoksičnim lijekom, primjerice aminoglikozidom, ili u bolesnika s već postojećom smanjenom funkcijom bubrega ili sluha.

Pedijatrijska populacija

Sigurnosni profil je generalno konzistentan kod primjene u djece i odraslih bolesnika.

Nefrotoksičnost je opisana u djece, obično kod istodobne primjene s drugim nefrotoksičnim lijekovima kao što su aminoglikozidi.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

4.9 Predoziranje

Preporučuje se potporna njega, uz održavanje glomerularne filtracije.

Vankomicin se slabo odstranjuje iz krvi hemodializom ili peritonealnom dijalizom. Zabilježeno je da hemoperfuzija primjenom smole Amberlit XAD-4 pokazuje ograničenu korist.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: pripravci za liječenje bakterijskih infekcija za sustavnu primjenu, glikopeptidni antimikrobici, ATK oznaka: J01XA01

Mehanizam djelovanja

Vankomicin je triciklički glikopeptidni antibiotik koji inhibira sintezu stanične stijenke u osjetljivim bakterijama vezivanjem visokim afinitetom na D-alanil-D-alaninski kraj prekursorskih jedinica stanične stijenke. Lijek je sporo baktericidan za mikroorganizme koji se dijele. Osim toga, ometa propusnost bakterijske stanične membrane i sintezu RNK.

Farmakokinetički/farmakodinamički odnos

Vankomicin pokazuje aktivnost neovisnu o koncentraciji s površinom ispod krivulje koncentracije (AUC) podijeljenom s minimalnom inhibitornom koncentracijom (MIK) ciljnog organizma kao primarnim prediktivnim parametrom djelotvornosti. Na temelju *in vitro* podataka, u životinja i ograničenih podataka u ljudi, AUC/MIK omjer = 400 je utvrđen kao PK/PD cilj kako bi se postigla klinička učinkovitost vankomicina. Da bi se postigao ovaj odnos kada su MIK-ovi $\geq 1,0 \text{ mg/l}$, potrebno je doziranje u gornjem rasponu i visoke najniže koncentracije u serumu (15-20 mg/l) (vidjeti dio 4.2).

Mehanizam rezistencije

Stečena rezistencija na glikopeptide najčešća je kod enterokoka i temelji se na usvajanju različitih kompleksa *van* gena koji modificiraju D-alanil-D-alaninski dio u D-alanil-D-laktatni ili D-alanil-D-serinski koji slabo vežu vankomicin. U nekim zemljama opaženo je povećanje broja slučajeva rezistencije posebno kod enterokoka; multirezistentni sojevi *Enterococcus faecium* su posebno alarmantni.

Van geni se rijetko pronađaju u vrsti *Staphylococcus aureus*, gdje promjene u strukturi stanične stijenke rezultiraju „srednjom“ osjetljivošću koja je najčešće heterogena. Prijavljeni su također i sojevi stafilokoka rezistentni na meticilin (MRSA) sa smanjenom osjetljivošću na vankomicin. Smanjena osjetljivost ili rezistencija na vankomicin kod stafilokoka nije sasvim razjašnjena. Potrebno je nekoliko genetičkih elemenata i višestrukih mutacija.

Ne postoji križna rezistencija između vankomicina i drugih skupina antibiotika. Međutim, poznata je pojava križne rezistencije s drugim glikopeptidnim antibioticima, kao što je teikoplanin. Sekundarni razvoj rezistencije tijekom terapije je rijedak.

Sinergizam

Kombinacija vankomicina s aminoglikozidnim antibioticima ima sinergistički učinak protiv mnogih sojeva *Staphylococcus aureus*, ne-enterokokne skupine D-streptokoka, enterokoka i streptokoka iz skupine *Viridans*. Kombinacija vankomicina s cefalosporinima ima sinergistički učinak protiv nekih sojeva *Staphylococcus epidermidis* rezistentnih na oksacilin, a kombinacija vankomicina s rifampicinom ima sinergistički učinak protiv *Staphylococcus epidermidis* i djelomični sinergistički učinak protiv nekih sojeva *Staphylococcus aureus*. S obzirom da vankomicin u kombinaciji s cefalosporinima također može imati antagonistički učinak protiv nekih sojeva *Staphylococcus epidermidis* i u kombinaciji s rifampicinom protiv nekih sojeva *Staphylococcus aureus*, korisno je napraviti prethodno testiranje sinergizma.

Potrebno je uzeti uzorke za bakterijske kulture kako bi se mogli izolirati i identificirati uzročnici i odrediti njihovu osjetljivost na vankomicin.

Granične vrijednosti ispitivanja osjetljivosti

Vankomicin je djelotvoran protiv gram-pozitivnih bakterija, kao što su stafilokoki, streptokoki, enterokoki, pneumokoki i klostridije. Gram-negativne bakterije su rezistentne.

Prevalencija stečene rezistencije za određene vrste može se razlikovati geografski i vremenski, stoga su poželjni lokalni podaci o rezistenciji, posebice kod liječenja teških infekcija. Ako postoji sumnja u učinkovitost vankomicina barem kod nekih tipova infekcija, temeljena na podacima o lokalnoj prevalenciji rezistencije, potrebno je potražiti savjet stručnjaka. Ovi podaci daju samo približne smjernice o vjerojatnosti da su mikroorganizmi osjetljivi na vankomicin.

Granične vrijednosti minimalne inhibitorne koncentracije (MIK) koje je odredilo Europsko povjerenstvo za ispitivanje antimikrobne osjetljivosti (EUCAST) su sljedeće:

	Osjetljivi	Rezistentni
<i>Staphylococcus aureus</i> ¹	$\leq 2 \text{ mg/l}$	$> 2 \text{ mg/l}$
Koagulaza-negativni stafilokoki ¹	$\leq 4 \text{ mg/l}$	$\geq 4 \text{ mg/l}$
<i>Enterococcus</i> spp.	$\leq 4 \text{ mg/l}$	$> 4 \text{ mg/l}$
Streptokoki skupine A, B, C i G	$\leq 2 \text{ mg/l}$	$\geq 2 \text{ mg/l}$
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	$\leq 2 \text{ mg/l}$	$\geq 2 \text{ mg/l}$
Gram-pozitivni anaerobi	$\leq 2 \text{ mg/l}$	$> 2 \text{ mg/l}$

¹ *S. aureus* s vrijednostima MIK-a za vankomicin koji iznosi 2 mg/l su na granici distribucije divljeg tipa i može doći do smanjenog kliničkog odgovora.

Vrste koje su obično osjetljive
Gram-pozitivne
<i>Enterococcus faecalis</i>
<i>Staphylococcus aureus</i>
meticilin-rezistentni <i>Staphylococcus aureus</i>
koagulaza-negativni Staphylococci
<i>Streptococcus</i> spp.
<i>Streptococcus pneumoniae</i>
<i>Enterococcus</i> spp.
<i>Staphylococcus</i> spp.
Anaerobne vrste
<i>Clostridium</i> spp. s izuzećem <i>Clostridium innocuum</i>
<i>Eubacterium</i> spp.
<i>Peptostreptococcus</i> spp.
Vrste kod kojih stečena rezistencija može predstavljati problem
<i>Enterococcus faecium</i>
Vrste koje su urođeno rezistentne
Sve gram-negativne bakterije
Gram-pozitivne aerobne vrste
<i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> ,
<i>Heterofermentative Lactobacillus</i> ,
<i>Leuconostoc</i> spp
<i>Pediococcus</i> spp.
Anaerobne vrste
<i>Clostridium innocuum</i>
Pojava rezistencije na vankomicin se razlikuje od bolnice do bolnice, stoga je potrebno kontaktirati lokalni mikrobiološki laboratorij za relevantne informacije.

5.2 Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Vankomicin se primjenjuje intravenski za liječenje sustavnih infekcija.

Kod bolesnika s normalnom funkcijom bubrega, intravenska infuzija višekratnih doza od 1 g vankomicina (15 mg/kg) tijekom 60 minuta postiže približne prosječne koncentracije u plazmi od 50 – 60 mg/l odmah, 20 – 25 mg/l 2 sata nakon završetka infuzije i 5 – 10 mg/l 11 sati nakon završetka primjene infuzije. Razine u plazmi dobivene nakon višekratnih doza su slične onima

koje se postižu nakon jednokratne doze.

Vankomicin se obično ne apsorbira u krv nakon primjene kroz usta. Međutim, može doći do apsorpcije nakon peroralne primjene u bolesnika s (pseudomembranoznim) kolitisom. Ovo može dovesti do nakupljanja vankomicina u bolesnika s postojećim oštećenjem funkcije bubrega.

Distribucija

Volumen distribucije je oko $60 \text{ l}/1,73 \text{ m}^2$ površine tijela. Pri serumskim koncentracijama vankomicina od 10 mg/l do 100 mg/l vezanje lijeka na proteine plazme je približno $30 - 55 \%$, mjereno ultrafiltracijom.

Vankomicin lako prolazi kroz placentu i distribuira se u krv pupčane vrpce. Kod neupaljenih moždanih ovojnica, vankomicin prolazi krvno-moždanu barijeru samo u maloj mjeri.

Biotransformacija

Metabolizam lijeka je vrlo mali. Nakon parenteralne primjene izlučuje se gotovo u potpunosti kao mikrobiološki aktivna tvar (pribl. $75 - 90 \%$ u 24 sata) glomerularnom filtracijom putem bubrega.

Eliminacija

Poluvijek izlučivanja vankomicina je 4 do 6 sati u bolesnika s normalnom funkcijom bubrega i $2,2 - 3$ sata u djece. Klirens plazme je oko $0,058 \text{ l/kg/h}$, a klirens bubrega oko $0,048 \text{ l/kg/h}$. Tijekom prva 24 sata približno 80% primijenjene doze vankomicina izlučuje se putem mokraće glomerularnom filtracijom. Bubrežna disfunkcija odgada izlučivanje vankomicina. U anefričnih bolesnika prosječan poluvijek je 7,5 dana. Zbog ototoksičnosti vankomicina potrebno je u takvima slučajevima uz liječenje pratiti koncentracije u plazmi.

Izlučivanje putem žuči je beznačajno (manje od 5 % doze).

Iako se vankomicin ne eliminira učinkovito hemodializom ili peritonealnom dijalizom, bilo je prijava o povećanom klirensu vankomicina hemoperfuzijom i hemofiltracijom.

Nakon primjene kroz usta samo dio primijenjene doze se izdvoji u mokraći. Suprotno tome, visoke koncentracije vankomicina pronadene su u stolici ($> 3100 \text{ mg/kg}$ s dozama od 2 g/dan).

Linearost/nelinearnost

Koncentracija vankomicina uglavnom se povećava proporcionalno s povećanjem doze. Koncentracije u plazmi tijekom višekratnog doziranja su slične onima nakon primjene jednokratne doze.

Posebne populacije

Bolesnici s oštećenjem funkcije bubrega

Vankomicin se primarno eliminira glomerularnom filtracijom. U bolesnika s oslabljenom funkcijom bubrega terminalni poluvijek eliminacije vankomicina je produljen, a ukupni klirens smanjen.

Posljedično je potrebno izračunati optimalnu dozu u skladu s preporukama za doziranje navedenima u dijelu 4.2 Doziranje i način primjene.

Bolesnici s oštećenjem funkcije jetre

Farmakokinetika vankomicina ne mijenja se u bolesnika s oštećenjem funkcije jetre.

Trudnice

Može biti potrebno značajno povećanje doze kako bi se postigla terapijska serumska koncentracija u trudnica (vidjeti dio 4.6).

U kontroliranom kliničkom ispitivanju, procjenjivan je potencijal ototoksičnih i nefrotoksičnih učinaka vankomicinklorida na dojenčad, kod primjene u trudnica za liječenje ozbiljnih stafilokoknih infekcija kod intravenske zlouporabe lijeka. Vankomicinklorid je nađen u krvi iz pupkovine. Nije zamijećen senzorni gubitak sluha ili nefrotoksičnost povezana s primjenom vankomicina. Jedno dojenče, čija je majka primala vankomicin u trećem tromjesečju, doživjelo je provodni gubitak sluha koji se nije pripisao primjeni vankomicina. S obzirom da se vankomicin primjenjivao samo u drugom i trećem tromjesečju trudnoće, nije poznato da li uzrokuje oštećenje fetusa.

Bolesnici s prekomjernom tjelesnom težinom

Distribucija vankomicina može biti promijenjena u bolesnika s prekomjernom tjelesnom težinom zbog povećanja volumena distribucije, bubrežnog klirensa i mogućih promjena u vezanju na proteine plazme. U toj subpopulaciji pronađene su serumske koncentracije vankomicina više od očekivanih u zdravih muških odraslih osoba (vidjeti dio 4.2).

Pedijatrijska populacija

PK vankomicina pokazuje široku interindividualnu varijabilnost u nedonoščadi i novorođenčadi rođene u terminu. U novorođenčadi, nakon intravenske primjene, volumen distribucije vankomicina varira između 0,38 i 0,97 l/kg, slično vrijednostima u odraslih osoba, a klirens varira između 0,63 i 1,4 ml/kg/min. Poluvijek varira između 3,5 i 10 sati i dulji je nego u odraslih, odražavajući uobičajene niže vrijednosti klirensa u novorođenčadi.

U dojenčadi i starije djece volumen distribucije je u rasponu od 0,26 do 1,05 l/kg, dok klirens varira između 0,33 – 1,87 ml/kg/min.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Iako dugotrajna ispitivanja na životnjama nisu provedena za procjenu karcinogenog potencijala, u standardnim laboratorijskim testovima nije nađen mutageni potencijal. Ispitivanja teratogenosti provedena su u štakora pri 5 puta većim dozama od humanih doza, te u kunića pri 3 puta većim dozama od humanih doza i nisu dokazala štetne učinke vankomicina na fetus.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

Nema.

6.2 Inkompatibilnosti

Otopina vankomicina ima nizak pH, što može izazvati kemijsku ili fizikalnu nestabilnost kada se pomiješa s drugim tvarima. Treba izbjegavati miješanje s alkalnim otopinama.

Mješavine otopina vankomicina i beta-laktamskih antibiotika su pokazale fizikalnu inkompatibilnost. Mogućnost precipitacije raste kod većih koncentracija vankomicina. Preporuča se ispiranje intravenskih linija između primjena tih antibiotika. Također se preporuča razrjeđenje otopine vankomicina na 5 mg/ml i niže.

Iako intravitrealna injekcija nije odobrena kao put primjene vankomicina, zabilježena je precipitacija nakon intravitrealne primjene vankomicina i ceftazidima za endoftalmitis uz upotrebu odvojenih štrcaljki i igala. Precipitati su se postupno razgradili što je dovelo do potpunog čišćenja vitrealne šupljine i poboljšanja vida kroz 2 mjeseca.

Ovaj se lijek ne smije miješati s drugim lijekovima, osim onih navedenih u dijelu 6.6.

6.3 Rok valjanosti

Prašak:

3 godine.

Rekonstituirana otopina:

Otopina rekonstituirana pomoću vode za injekciju je stabilna 24 sata pri temperaturi 2 °C – 8 °C. S mikrobiološkog stajališta pripremljena otopina lijeka se mora primijeniti odmah.

Razrijeđena otopina:

Kemijska i fizikalna stabilnost dokazana je kako slijedi:

- 8 sati pri 25 °C nakon rekonstitucije i daljnog razrjeđenja otopinom natrijevog klorida 9 mg/ml (9%) ili otopinom glukoze 50 mg/ml (5%);
- 4 dana pri 2-8 °C nakon rekonstitucije i daljnog razrjeđenja otopinom Ringerovog laktata i otopinom Ringerovog acetata;
- 14 dana pri 2-8 °C nakon rekonstitucije i daljnog razrjeđenja otopinom natrijevog klorida 9 mg/ml (9%) ili otopinom glukoze 50 mg/ml (5%).

S mikrobiološkog stajališta pripremljena otopina lijeka se mora primijeniti odmah.

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Prašak u originalnom pakiranju:

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Za uvjete čuvanja rekonstituiranog i razrijeđenog lijeka, vidjeti dio 6.3.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

Vankomicin Aptapharma 500 mg: bezbojne prozirne staklene bočice vrste I od 10 ml s klorbutilnim gumenim čepom tipa I i bijelom aluminijskom i polipropilenskom kapicom sa samoljepljivom identifikacijskom markicom.

Vankomicin Aptapharma 1000 mg: bezbojne prozirne staklene bočice vrste I od 20 ml s klorbutilnim gumenim čepom tipa I i plavom aluminijskom i polipropilenskom kapicom sa samoljepljivom identifikacijskom markicom.

Pakiranje sadrži 1 ili 10 bočica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Samo za jednokratnu upotrebu. Neiskorišteni lijek se mora baciti.

Prije primjene, prašak se mora rekonstituirati, a dobiveni koncentrat razrijediti.

Priprema rekonstituirane otopine

Vankomicin Aptapharma 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju
Otopite prašak u 10 ml sterilne vode za injekciju.

Vankomicin Aptapharma 1000 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju
Otopite prašak u 20 ml sterilne vode za injekciju.

Jedan ml rekonstituirane otopine sadrži 50 mg vankomicina.

Izgled rekonstituirane otopine

Nakon rekonstitucije otopina je bistra i bezbojna, bez vidljivih čestica.

Nakon rekonstitucije pH otopine je između 2,5 – 4,5.

Za uvjete čuvanja rekonstituiranog lijeka, vidjeti dio 6.3.

POTREBNO JE DALJNJE RAZRJEĐIVANJE. Vidjeti upute koje su niže navedene:

Priprema konačne razrijedene otopine za infuziju

Preporučeni način primjene je **intermitentna infuzija**.

Vankomicin AptaPharma 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Rekonstituirana otopina koja sadrži 500 mg vankomicina mora se razrijediti s najmanje 100 ml otopine za razrjeđivanje.

Vankomicin AptaPharma 1000 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Rekonstituirana otopina koja sadrži 1000 mg vankomicina mora se razrijediti s najmanje 200 ml otopine za razrjeđivanje.

Prikladne otopine za razrjeđivanje su:

- natrijev klorid 9 mg/ml (0,9%)
- otopina glukoze 50 mg/ml (5%)
- otopina Ringerovog laktata
- otopina Ringerovog acetata

Željena doza se mora primijeniti sporom intravenskom infuzijom tijekom najmanje 60 minuta.

Ukoliko se primjeni tijekom kraćeg razdoblja ili u većoj koncentraciji, postoji mogućnost pojave značajne hipotenzije u kombinaciji s tromboflebitisom. Brzo doziranje također može prouzročiti nalete crvenila i prolazni osip po vratu i ramenima.

Kontinuirana infuzija (treba primijeniti samo ukoliko intermitentna infuzija nije provediva)

U dovoljno veliki volumen otopine natrijevog klorida 9 mg/ml (0,9%), otopine glukoze 50 mg/ml (5%), otopine Ringerovog laktat ili otopine Ringerovog acetata treba dodati:

- dvije do četiri boćice vankomicina od 500 mg (1-2 g) ili
- jednu do dvije boćice vankomicina od 1000 mg (1-2 g)

kako bi se intravenoznim dripom polako primijenila željena dnevna doza kroz period od 24 sata.

Preporučene koncentracije ne prelaze 5 mg/ml. U bolesnika kod kojih je unos tekućine ograničen, može se upotrijebiti koncentracija do 10 mg/ml (vidjeti dio 4.2).

Jedna doza se mora primijeniti brzinom od najviše 10 mg/min.

Za uvjete čuvanja razrijedene otopine lijeka pogledajte dio 6.3, Rok valjanosti. Prije primjene, rekonstituiranu i razrijedenu otopinu treba vizualno provjeriti na vidljive čestice i promjenu boje. Smije se primijeniti samo bistra i bezbojna otopina bez vidljivih čestica.

Peroralna primjena

Može se koristiti sadržaj boćice od 500 mg za parenteralnu primjenu.

Može se koristiti sadržaj boćice od 1000 mg za parenteralnu primjenu.

Kod primjene otopini se mogu dodati sirupi kako bi se poboljšao okus.

Odlaganje:

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Apta Medica Internacional d.o.o.
Likozarjeva ul.6
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon: +386 51 300 343
Fax: +386 59 336 941

8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Vankomicin Aptapharma 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju: HR-H-503941848
Vankomicin Aptapharma 1000 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju: HR-H-541482958

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 10. kolovoza 2021.

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

/